
(σ) D2/61-g-12 61



13942

SYNOPSIS
NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

EXHIBENS

CLARISS. VIRORUM

SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI, ET *MACBRIDII,*

SYSTEMATA NOSOLOGICA,

EDIDIT

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

ADJECIT

GULIELMUS CULLEN, M.D.

ET NUPER IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF. ET MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS, &c. &c.

EDITIO QUINTA,

EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,

DUOBUS TOMIS.

TOM. I.

EDINBURGI:
Proſtant venales apud GULIELMUM CREECH.

M, DCC, XCII.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON

PRÆFATIO AUCTORIS

AD

QUARTAM EDITIONEM.

L E C T O R I

S.

PRODIT jam quarta vice, multum, ni nos fallunt amici, expetita Synopſis haec noſologiae methodicae. Quam, ut expectationi eruditorum pro virili ſatisfacerem, plurimum auctam, ubique emendatam, et uſibus, ut ſpero, medicorum accommodatiorem, exhibui.

Ut

Ut omnia fere, ad rem noſologicam ſpectantia jam edita, ſub uno conſpectu hic ponerem, ex ſyſtemate ſymptomatico Clar. Mich. Sagari, Anno 1776 Viennae edito, quae ad genera morborum definienda pertinent excerpta, hic iterum dedi; et ſimul, quae ex ſcriptis egregii viri Davidis Macbride ad eandem finem conferre poſſent, hic primum addidi.

Quæ porro in re noſologica ipſe conatus ſum, emendatoria, et plurimum aucta, hic protuli; quae tamen de his ulterius hic dicenda eſſent, in Prolegomenis, initio tomi hujus operis alterius praefixis, inveniri poſſunt; atque illuc Lectorem ablegamus.

PARS PRIMA.

GENERA

MORBORUM

DEFINITA

Ab Eruditiſſimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica, 2 tom. 4to.

Amſtel. 1768.

SERIES

CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

ORDO I. MACULÆ.
O. II. EFFLORESCENTIÆ.
O. III. PHYMATA.
O. IV. EXCRESCENTIÆ.
O. V. CYSTIDES.
O. VI. ECTOPIÆ.
O. VII. PLAGÆ.

CL. II. FEBRES.

O. I. CONTINUÆ.
O. II. REMITTENTES.
O. III. INTERMITTENTES.

CL. III. PHLEGMASIÆ.

O. I. EXANTHEMATICÆ.
O. II. MEMBRANACEÆ.
O. III. PARENCHYMATOSÆ.

CL. IV. SPASMI.

O. I. TONICI PARTIALES.
O. II. TONICI GENERALES.
O. III. CLONICI PARTIALES.
O. IV. CLONICI GENERALES.

CL. V. ANHELATIONES.

O. I. SPASMODICÆ.
O. II. OPPRESSIVÆ.

CL. VI. DEBILITATES.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.
O. II. ANEPITHYMIÆ.
O. III. DYSCINESIÆ.
O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.
O. V. COMATA.

CL. VII. DOLORES.

O. I. VAGI.
O. II. DOLORES CAPITIS.
O. III. DOLORES PECTORIS.
O. IV. DOLORES ABDOMINALES INTERNI.
O. V. DOLORES EXTERNI ET ARTUUM.

CL. VIII. VESANIÆ.

O. I. HALLUCINATIONES.
O. II. MOROSITATES.
O. III. DELIRIA.
O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

CL. IX. FLUXUS.

O. I. SANGUIFLUXUS.
O. II. ALVIFLUXUS.
1. *Sanguinolenti.*
2. *Non Sanguinolenti.*
O. III. SERIFLUXUS.
O. IV. AERIFLUXUS.

CL. X. CACHEXIÆ.

O. I. MACIES.
O. II. INTUMESCENTIÆ.
O. III. HYDROPES PARTIALES.
O. IV. TUBERA.
O. V. IMPETIGINES.
O. VI. ICTERITIÆ.
O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

GENERA MORBORUM

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidenſia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymboſa, ſeu ex minoribus maculis compoſita, cum depreſſione cutis.

G. III. EPHELIS. 3

Maculae acquiſitae, umbrinae, glabrae, corymboſae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut aſperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOMA.

Macula nigricans, vel atro rubra, aut liveſcens, ſucceſſu temporis flaveſcens, non congenita, nec aſpera, ſed plana, aut parum prominens, et ſubſolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per puſtulas, papulas, phlyctaenas, varos, ſimileſve aſperitates.

a. Puſtula. Phyma parvulum apice ruptum.

b. Papula. Phyma parvulum deſquamari ſolitum.

c. Phlyctaena. Veſicula fluido ſeroſo plena.

d. Varus. Tuberculum durum conſtans.

G. VII. HERPES. 7

Efflorefcentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginoſis, in ſquamas ſurfuraceas, raro cruſtaceas, abeuntibus.

G. VIII. EPINYCTIS. 8

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potiſſimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRACIA. 9

Phymata eryſipelatoſa.

G. X. HIDROA. 10

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, ſolitarii.

G. XI. ERYTHEMA. 11

Tumor ſine febre, ſuperficiarius, ſolitarius, diffuſus, rubro roſeus, preſſione evaneſcens,

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffuſus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffuſus, elaſticus, preſſione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor ſphaeroideus, rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in ſuppuratum lentiſſime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum,

cum ſuppuratus eſt, occupant fibrae craſſae, que in pus non colliqueſcunt.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangraenoſum, ambitu inflammatum.

G. XX. CANCER. 20

Tumor durus, tuberoſus, lancinans, pertinaciſſimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

G. XXII. PHIMOSIS. 22

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis, indolentes, lente creſcentes, in ſuppurationem ſponte non abeuntes.

G. XXIII. SARCOMA. 23

Excreſcentia carnis conſiſtentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excreſcentia firma carnibus durior, oſſibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excreſcentia cutanea prominens, condylomate minor, ſenſu deſtituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excreſcentia carnea, vel membranaceo-vaſculoſa ad oculi canthum exorta, alam expanſam referens, et verſus corneam ſe extendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix ſenſu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enaſcens, ſphaericus, piſo ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excreſcentia vel tumor ſcirrhoſus anticae partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor oſſis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Oſſium pectoris indecora prominentia a tu-

more, luxatione, diſtortione, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. LORDOSIS. 31

Oſſium diſtortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur oſſa, vel a ſitu deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis diſtendentibus.

G. XXXII. ANEURISMA. 32

Cyſtis arterioſa.

G. XXXIII. VARIX. 33

Cyſtis venoſa.

G. XXXIV. HYDATIS. 34

Cyſtis lymphaeductuum.

G. XXXV. MARISCA. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, ſaepe dolentes, et cruorem ſaepe fundentes, ſponte dein recedere ſoliti.

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cyſtis aquoſa a corneae proptoſi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapſa.

37 G XXXVII. LUPIA.

Cyſtis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHRUS.

Cyſtis articuli aquoſa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cyſtis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cyſtis umbilicalis ſaepius aquoſa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cyſtis in ſcroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoſes, Celes, Pararthremata, *Graec.*

Prolapſus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium ſolidarum e ſua ſede dimotio ſenſibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapſus, Expreſſio oculi, *Lat.* Hygrophthalmia, Elephantiaſis oculi, *Boerh.* de Morb. Ocul. pars II cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus ſeu Buphthalmia, Ophthalmoptoſis, Ecpieſmus *Graecorum.* *Mauchart*, diſſ. de Hydrophthalmia, et oculi Paracenteſi inter *Haller.* Diſput. Chir. tom. 1.

Groſſeur contre Nature, Hydropiſie, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan*, part II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata ſenſibiliter nativa ipſius magnitudine.

G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.* 43

Blepharoptoſis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae ſuperioris caſus, Retractio, Palpebrarum introverſio, extroverſio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere ſuperieure, eraillement des paupieres, trichiaſe avec introverſion des tarſes. Vide *Platner*, Inſtit. Chirurg. § 577. § 584.; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerh.* de Morb. ocul. part. I. cap. 5.; *Heiſter.* Chir. tom. 1. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter.* Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebrae utriuſque vel alterutrius elongatae, retractae, introverſae, vel extroverſae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craſpedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapſus, *Nenter.* tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heiſter*, Chir. tom. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralyſis, caſus, *Gorter*, Praxis Med. Syſt. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis ſue uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incraſſatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumeſcentia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valeſci de Taranta* Philon. lib. 2 cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Hiſtor. Mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Gloſſocele *Gaubii Pathol.* § 242.; Linguae extruſio, Idem, § 254.

Renverſement de la langue dans le goſier, *Petit.* Mem. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-

lutae vel ore extruſae, exundantis, exertae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externae, etiam ante lapſum conſpicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione, diverſae procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamenſium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapſus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. p. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. 1. chap. 28.; *Levret* obſ. ſur les polypes, ſect. 3. page 165.

Sphincteris ani, et inteſtini recti inverſi, procidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapſus, inverſio veſicae urinariae *Auctorum*; *Salzmanni* diſſ. de Hern. veſicae inter *Halleri* Diſp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. page 741.

Renverſement de la veſſie urinaire. *Noel* obſ.; Recherches ſur la Hernie de la veſſie par *Verdier*; Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.

Membranae tum veſicae corpus, tum ipſius

collum, interne obveſtientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hyſteroceles nudae *Pathol. Method.* edit. 3.

Relaxatio, prolapſus, procidentia, inverſio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut *Heiſteri* Inſt. Chir. tom. 2.; *Gunzii* de Herniis, &c.

Relachement, chute, deſcente, renverſement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c; *Puzos* ſur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia inteſtini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE. *Ign. la Chauſſe.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* reſp. ad Doring. pag. 915.; *Blegney* Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obſ. 2. pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. la Chauſſe* Diſſ. de hernia ventrali, et *Kirſchbaum* Diſſ. de hern. ventriculi in diſp. Chir. Haller. tom. 3. Diſſ. 68. 69.

Herniae de l'eſtomac, *La Faye* ſur *Dionis*, pag. 121.; *Arnaud* Tr. des hernies, preface, p. 81.; *Sharp* Rech,

Crit. chap. I ; *Garengeot*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 1. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigaſtricae parietes, imò et per umbilici annulum elapſi ectopia hernioſa.

G. LIII. HEPATOCELE., *Gunzii* Libell. de hern. p. 4. 53

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII. ; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipſum umbilicum ectopia hernioſa.

G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4. 54

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, Epiſt. LV. pag. 999; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14. ; *Ruyſchii* Adverſ. Anat. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. 1. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere ſiniſtro parietes, vel per inguinalem ejuſdem lateris annulum elapſi ectopia hernioſa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. 4. Med. Pract. part II. ſect. II. cap. 17.; *Doringii* Epiſt. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, p. 893.; *Graaf.* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyſch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies, tom. 1. pag. 29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri trans annulos inguinales, ut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapſi ectopia hernioſa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner.* Inſt. Chir. *Ign. la Chauſſe* de hern. ventrali.

Hernia cyſtica *quorundam.*

Hernia veſicae urinariae *Salzmanni* Diſſ. inter *Halleri* Diſp. Chir. tom. 3. Diſſ. 72.; *Gunzii* Libell. de hern. &c.

Hernie de la veſſie urinaire *Mery.* Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obſ. ſur les Polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.

Veſicae urinarie trans annulos inguinales, ſub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogaſtrii, necnon vaginae parietes elapſae ectopia hernioſa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* Diſſ. de hern. Cerebri inter *Halleri* Diſp. Chir. tom. 2. Diſſ. XLVI. 57

Hernia cerebri, *Reiſelii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obſ. 115.; *Lechelii* ibid. Obſ. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738, Hebd 52. n. 3.; *Taconi* Diſſ de humano monſtro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obſ. de Chir. Obſ. 1.

Cerebri, cerebelli, aut utriuſque, verbo Encephali, per oſſium cranii non penitus oſſificatorum hiatum prorumpentis, ectopia hernioſa.

G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. Obſtetric. § 449. —507.; *Levret* Obſerv. ſur les Accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap. 46. 47 48.; *Ruyſchii*, Obſerv. XCVIII

Inclinaiſon, obliquitè de le matrice, *Sabatier*, Mem. de l'Acad. de Chir. tom. 3. &c.

Uteri, ſaepius gravidi, et contra quam in hyſterocele fit, abdominis clauſtris contenti ſitus in obliquum errans.

G LIX. PARORCHIDIUM. 59

Teſticulorum ſerior deſcenſus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiſſ. Obſerv.; *Ambr. Paraei* lib. vii.; *Thom.*

Bartholini Hiſt. Anat.; *Morgagn.* Adverſ. IV.; *Dionis* Oper. de Chir Dem. IV.; *Quelmalzii* inter Halleri Diſput. Anatom. tom. 5. Diſſert. 1; *Verdier* ſur la Hernie de la Veſſie, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.

Teſticuli unius, vel utriuſque, cujus poſt nativitatem ſedes naturalior ſcrotum eſt, ſitus in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthroſis, Parathrema *eorund.*

Luxatio, ſubluxatio, diſtortio, *Heiſter.* Inſt. Chir. tom. 1.; *Boerh.* Aph. Comment. tom. 1., *Gorter.* Chir. repurgat. cap. 6. *Platner.* Inſtit. Chir. § 1090—1213.

Luxation, entorſe, *Petit* Malad des Os, tom. 2.; *Coll de Villars* Chir. tom. 5.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. 2.

Separatio contigui in oſſium articulis diarthroſice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Oſſium receſſus, *Latin.*; *Petit.* tom. 2. chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474.; *Duverney* tom. 2. ch. 1. et 5.

Oſſium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, ſeparatio, ſeu receſſus ab invicem partialis vel totalis.

G. LXII. LOXARTHRUS. 62

Perverſio capitis oſſium ac muſculorum appenſorum, *Duverney*, tom. 2. cap. 2.
Artis vari *Duverney*, tom. 2. cap. 2.
Gibboſitas ſcapularis *Auctorum*.

Oſſium cum motu ſenſibili articulatorum ſitus relativus in alienum conſtanter mutatus, aut obliquitas reſpectiva perſiſtens citra exarthrema et ſpaſmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

G. LXIII. VULNUS, 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem ſuppurationemque tendens.

G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui ſolutio intus tantum extenſa.

G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulae vel cutis a carnibus ſubjectis ſeparatio.

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnoſi, potiſſimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vaſorum contritio, ecchymoma ſaepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica oſſis in fragmenta invicem non cohaerentia.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio oſſis in duas partes rima tantum diſſitas, et alterutro ſaltem extremo cohaerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum, ſolutio, vel vehemens diſtractio, cum vel ſine exarthremate.

70 G. LXX. AMPUTATURA, *Ill. Lin.* G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum oſſeis, cum artus, articuli, vel partis totali ſeparatione a reſiduo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium eroſio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroſo vel utcumque vitioſo.

G. LXXII. EXULCERATIO. 72
Excoriatio ulceroſa ſuppurans.

G. LXXIII. SINUS. 73
Cavitas ulceroſa, cujus fundus amplus, ſaepe multiplex deſinit in anguſtum orificium.

G. LXXIV. FISTULA. 74
Cavitas ulceroſa, ſinuoſa, cujus parietes calloſi ſunt ut plurimum, aut fundus ad os carioſum, arthrocace corruptum, pertingit.

G. LXXV. RHAGAS. 75
Solutio continui ſicca in partium marginibus.

G. LXXVI. ESCHARA. 76
Cruſta ſicca, mortua, fluidis ſolidiſque corporis humani coagmentata.

G. LXXVII. CARIES. 77
Oſſis ſuo perioſteo denudati decoloratio, aſperitas, exfoliatio et ſubſequens fragilitas ac eroſio.

G. LXXVIII. ARTHROCACE. 78
Ulcus medullae oſſium, ſaepius in epiphyſibus, cum carie, exoſtoſi, et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulſus magnitudo et frequentia cum frigore in inſultu, fervore in decurſu, madore in declinatione, et ſemper virium proſtratione majori quam a virium vitalium gradu foret exſpectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore ſaepius exordiens ſine exacerbatione partiali, et ſine acceſſu, non pluries quam ſemel vel bis in menſe revertens, ad uſque finem aegritudinis perſeverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decurſus aegritudinis intra dimidiam ſeptimanam abſolvitur. Vigor morbi ſubito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decurſus intra ſeptimanam, incrementum ſucceſſivum.

G. III. SYNOCHUS, *Galeni.* 81

Decurſus ad duas treſve ſeptimanas, cum pulſus robore ſanum, in morbi ſtatu ſaltem, notabiliter ſuperante.

G. IV. TYPHUS, *Hippocratis* 1. et 2. de 82 intern. affect. Foeſii 553.

Decurſus ultra duas ſeptimanas, ſaepius tres, cum calore et urina ſanorum ſimilibus, pulſuque quoad frequentiam ſano fere ſimili, et quoad robur non majori, artubus interea maxime proſtratis.

G. V. HECTICA, *Galeni* et *ejus Sequacium ; Sydenhami*, p. 524. 83

Decurſus ultra menſem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulſu poſt paſtum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu morbi creſcit et decreſcit, non omnino recedit, typus ſaepe confuſus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remiſſio quotidianae typum ſervat. Exacerbationes cum horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remiſſionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remiſſio quartanae typum ſervans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu aegritudinis deſerit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Acceſſus ſimiles quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galeni*.

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia ſaepius maligna, quandoque lenta.

G. I. PESTIS. 91

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis*, *Joubert*, et *antiquorum*. 92

Eruptio puſtularum phlegmonodearum in ſuppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter magnitudine ſero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, ſic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis* Practicae, lib. 3. cap. 1. de Variolae et Rubeolae Medela. 94

Eruptio papularum in ſquamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tuſſis ſiccà, ſternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctaenarum milii ſemini non majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculoſa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum ſynocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculoſa, rubra, pruriens, papuloſa, lata, parum uniformis, in ſquamulas furfuraceas abiens, ſed ſine praeludio catarrhali, et ſaepe ad ſecundam tertiamve vicem ſe prodens ac recondens viciſſim.

99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, ſuberyſipelatoſa, ſubito accedens per vices et recedens.

G. X. APHTHA. 100

Eruptio puſtuloſa, phlyctaenodes, et ulceroſa, in ore aut pudendis.

O. II. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo ſynochae vel ſynochi, cum dolore viſceris cujuſdam.

G. XI. PHRENITIS. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum pulſuſque major, pyrexia acuta.

G. XII. PARAPHRENESIS. 102

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

G. XIII. PLEURITIS. 103

Dolor lateris, reſpiratio et pulſus frequens, tuſſis.

G. XIV. GASTRITIS. 104

Dolor epigaſtrii, nauſea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

G. XV. ENTERITIS. 105

Dolor circa umbilicum vehemens, cum me-

teoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogaſtrium, et umbilicum juxta epiploi extenſionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extenſione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tenſio hypogaſtrii, cum dyſuria vel iſchuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtuſus, calor et tumor in viſceribus farctis, non ſacciformibus, cum pyrexia acuta, ſuppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio ſomnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyſpnoea ſtrangulante, dyſphagia, et pyrexia acuta.

G. XXI. CARDITIS. 111

Dolor ſub ſterno, pulſus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyſpnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni* I. Epid. Comm. 3. 113

Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

G. XXIV. SPLENITIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tollerans, cum febre ut plurimum remittente.

G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus, cum febre acuta, dyſuria, iſchuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, conſtans vel interpolata, muſculorum organis locomotivis, non vitalibus inſervientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi ſpaſmus axium opticorum divergentiam inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris ſpaſmus tonicus, vel clonicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli ſpaſmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujuſdam, ut brachii, vel cruris, conſtans, diuturna, rigiditas ſenſim exorta.

G. V. CRAMPUS. 120

Subitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas.

G. VI. PRIAPISMUS. 121

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

G. VII. TETANUS. 122

Spaſmus generalis ſubito ortus cum dyſpnoea.

G. VIII. CATOCHUS. 123

Spaſmus generalis ſenſim factus ſine dyſpnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujuſdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS. 124

Spaſmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. CARPHOLOGIA. 125

Motus velut convulſivus manuum, quo ae-

gri floccos e veſtibus evellere, paleas colligere, muſcas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Diſtenſio ſemivoluntaria plurium vel omnium ſucceſſive membrorum, ut plurimum cum oſcitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succuſſio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione ſonora, quaſi ſtertoroſa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel muſculi brevis et ſuperſtite in paroxyſmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Pulſatio in regione cordis pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate, reſpondens.

G. XVI. CLAUDICATIO. 131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter, dextrorſum vel ſiniſtrorſum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spaſmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extenſi.

G. XVII. RIGOR. 132

Totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

G. XVIII. ECLAMPSIA. 133

Artuum vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

G. XIX. EPILEPSIA. 134

Spaſmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum ſenſuum obſcuratione.

G. XX. HYSTERIA. 135

Artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſiſſima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis; inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genu retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, muſculorum pectoris, unde reſpiratio difficilis, frequens ſine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Inſultus fugaces, ſed ſaepius iterati ſpaſmodicorum motuum pectoris cum exſpiratione ſonora.

G. I. EPHIALTES. 138

Anhelatio difficilis, querula, cum inſomnio terrifico.

G. II. STERNUTATIO. 139

Concuſſio violenta pectoris, cum exſpiratione veloci narium interiora everrente et ſonora.

G. III. OSCEDO. 140

Diutina lenta profunda inſpiratio, ore hiante, ſaepius cum pandiculatione.

G. IV. SINGULTUS. 141

Concuſſio diaphragmatis cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

142 G. V. TUSSIS.

Concuſſio ſonora, violenta pectoris cum exſpiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, ſed conſtantes reſpirandi difficultates, cum pectoris non raro oppreſſione, frequenti anhelitu, difficultate illius ſuſpendendi, ſine metu ſuffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Reſpiratio inter inſpirandum, ſonum gravem, tremulum, in gutture edens, ſaepe cum alterno ſibilo.

144 G. VII. DYSPNŒA.

Difficultas reſpirandi chronica, non intermittens, ſine ſignis hydrothoracis vel empyematis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas reſpirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNŒA.

Praeceps ut plurimum et acuta reſpirandi difficultas.

G. X. ANGINA. 147

Difficultas reſpirandi, cum ſenſu obicis in gutture, et ſaepe deglutitione difficili, ſine phlegmaſia.

G. XI. PLEURODYNE. 148

Pectoris, laterifve dolor pungitivus cum reſpirandi difficultate citra phlegmaſiam acutam.

G. XII. RHEUMA. 149

Difficultas reſpirandi cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, ſternutatio, raucedo, &c.

G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Difficultas reſpirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, ſymptomatis ephialticis, alterutrius brachii ſtupore et aegritudine chronica non remittente.

G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, praegreſſa pulmonis inflammatione ſuppurata, et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et diſtincte ſentiendi, appetendi, conſueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac diſtincte ſentiendi ſine ſopore.

152 G. I. CATARACTA.

Viſus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Viſus debilitas obicibus opacis citra pupillam poſitis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Viſus debilitas reſpective ad citum, gradum lucis, diſtantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Viſus debilitas abſoluta ſine ulla organorum opacitate inaſſueta.

G. V. ANOSMIA. 156

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

G. VI. AGHEUSTIA. 157

Guſtus debilitas aut guſtandi impotentia.

G. VII. DYSECÆA. 158

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum poſitis.

G. VIII. PARACUSIS. 159

Voces articulatas diſtincte audiendi difficultas vel impotentia.

G. IX. COPHOSIS. 160

Sonos etiam ſimplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum poſito.

G. X. ANÆSTHESIA. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obſcuritas, ſine ſtupore et ſopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum ſenſitivorum debilitas notabilis, vel ſuppreſſio inſolita ſine ſopore.

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus eſculentorum ſuppreſſio, ſeu famis feriatio.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum ſuppreſſio, ſeu ſitis feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, ſeu libidinis, ſuppreſſio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac ſaepe ſenſus in organis libertati ſubditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem et ſyncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quaſdam ſyllabas literaſve pronunciandi impotentia.

G. XVII. PARAPHONIA. 168

Vocem ſolitam edendi impotentia.

G. XVIII. PARALYSIS. 169

Motus aut tactus, vel utriuſque in uno tantum artu debilitas.

G. XIX. HEMIPLEGIA. 170

Debilitas motus aut tactus vel utriuſque in alterutro corporis latere.

G. XX. PARAPLEXIA. 171

Debilitas ſenſus et motus in dimidio corporis tranſverſim ſumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

G. XXI. ASTHENIA. 172

Totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas, ſenſubus integris.

G. XXII. LEIPOTHYMIA. 173

Virium muſcularium totius corporis ſubitanea imminutio, pulſu ſuperſtite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium ſubitanea debilitas cum frigore, pallore, ſenſuumque obſcuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et ſenſuum apparens ceſſatio, mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Senſus omnis, appetitus, motus liberi, phantaſiae, memoriaeque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status ſoporoſus, cum artuum flexilitate, et ad quoſvis novos ſitus retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status ſoporoſus a gravi pathemate ſubito ortus, aegrum in eodem ſitu quo prehenſus eſt retinens, ſine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens ſopor cum pervigilio reali, vel ſopor levis e quo aegri facile excitantur, cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 179
Status ſoporoſus facile excitabilis cum ſummo imaginationis et memoriae torpore ac febre.
G. XXIX. CATAPHORA. 180
Status ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, et oblivione.
G. XXX. CARUS. 181
Sopor profundus ſine ſtertore.
G. XXXI. APOPLEXIA. 182
Sopor profundiſſimus cum ſtertore vel ſonora reſpiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujuſvis experientia cognoſcendi, nulla definitione diſtincte explicabiles ſunt.

O. I. VAGI.

Dolores et moleſtiae vagae ſaepius univerſales aut cutaneae ad phlegmaſias non referendae.

183 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor ſpontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, *Gorraei* definit.

Oſſium dolor non erraticus et internus in artubus.

185 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnoſa artuum.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, &c.

G. V. ANXIETAS. 187

Moleſtia quae ad continuam loci mutationem cogit.

G. VI. LASSITUDO. 188

Moleſtia cum debilitate quae ad quietem invitat.

G. VII. STUPOR. 189

Moleſtia quae ſenſum tactus obſcurat.

G. VIII. PRURITUS. 190

Moleſtia quae ad ſcalpendum nos cogit.

G. IX. ALGOR. 191

Moleſtia qualis a ſummo aëris frigore excitatur.

G. X. ARDOR. 192

Moleſtia qualis a ſummo aëris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

G. XI. CEPHALALGIA. 193

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tenſivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intollerantia et lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oeſophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Moleſtia deglutitionem impediens ſine notabili reſpirationis laeſione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Senſus ardoris in ventriculo et oeſophago ſine febre acuta.

G. XIX. CARDIOGMUS. 201

Gravis pertinaxque moleſtia in praecordiis, cum ſenſu ponderis et magnae molis pulſantis a minimo motu increſcens.

O. IV. DOLORES Abdominales Interni.

G. XX. CARDIALGIA. 202

Moleſtia in ſtomacho ſyncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicumque dolor notabilis et conſtans in regione ſtomachi, qui continua animi defectione non ſtipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gaſtritis.

G. XXII. COLICA. 204

Dolor inteſtinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA. 205

Moleſta ſenſatio, gravativa, tenſiva, aut alia quaevis in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut moleſtia in regione lienis ſine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA, *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum ſequens, cum nauſea, teſtis retractione in viris, cruris ſtupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA, *Montalti.*

Dolor uteri ſine niſu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi et Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA, *Aſtrucii.*

Dolor abdominis et ſpinae dorſi in brachiorum paralyſin aut convulſiones deſinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI. ISCHIAS. 213

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem ſaepius inducens.

G. XXXII. PROCTALGIA. 214

Dolor podicis citra teneſmum.

G. XXXIII. PUDENDAGRA. 215

Dolor genitalium citra dyſuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis ſalvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quieſcentia e loco moveri vel in gyrum verſari nobis videntur. Ipſe aeger ſibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non ſunt, imaginaria viſio.

218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. SYROGMOS.

Auditio imaginaria ſoni, cujus nullum eſt extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus ſe in mortis

periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliiſque levidenſibus malis, imaginatur.

G. VI. SOMNAMBULISMUS. 221
Somniantes e lecto ſurgunt, vigilantium munia exſequuntur, et ſe ſaepe diverſis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averſationes depravatae.

G. VII. PICA. 222
Alimentorum conſuetorum averſatio, cum inaſſuetorum, ſaniſque inſalubrium, appetitu.

G. VIII. BULIMIA. 223
Appetitus eſculentorum copiae majoris quam quae digeri poſſit.

G. IX. POLYDIPSIA. 224
Appetitus majoris ſolito copiae potulentorum.

G. X. ANTIPATHIA. 225
Quorundam objectorum tanta averſatio ut.

ex eorum viſu, vel olfactu, aeger gravia ſymptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum ſine cauſa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudenſque veneris cupiditas cum libidinoſa penis tentigine.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris deſiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel ſaltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum averſatio, ſaepius a morſu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232
Delirium fugax, a veneno, ut altero morbo dependens.
G. XVIII. AMENTIA. 233
Delirium univerſale mite, ſine furore et audacia, cum morbo diuturno.
G. XIX. MELANCHOLIA. 234
Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.
G. XX. MANIA. 235
Delirium univerſale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.
G. XXI. DÆMONOMANIA. 236
Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.
G. XXII. AMNESIA. 237
Omnis memoriae feriatio.
G. XXIII. AGRYPNIA. 238
Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, deſuetudine notabilis eſt

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel ſanguinolentae materiae ejectio ſine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus ſanguinis e naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tuſſi ſine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus ſanguinis e gingivis ſaepius foetidis, putridiſve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oeſophago cum vomitorio conatu.

G. V. HÆMATURIA. 243

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emiſſio.

G. VI. MENORRHAGIA. 244

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitioſus.

G. VII. ABORTUS. 245

Foetus immaturi, ſaepius cum menorrhagia ex utero, excluſio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitioſa per os aut anum rejectio.

I. *Alvifluxus ſanguinolenti.*

G. VIII. HEPATIRRHŒA. 246

Alvifluxus per inferiora ſeroſo-cruentus nec ater nec torminoſus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariſcis ruptis obſito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens, torminoſa, ſaepe teneſmodes, faecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora, frequens rejectio.

II. *Alvifluxus non ſanguinolenti.*

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emiſſio ; affinis eſt aëri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oeſophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigaſtrium dolor, ſeu gaſtrodynia, alvi conſtipatio, et faeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio bilioſa aut acris aſſidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium proſtratione, et non raro ſurarum crampis.

G. XVI. DIARRHŒA. 254

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempeſtiva, dejectio.

G. XVII. CŒLIACA. 255

Albeſcentium, aut chilacearum materierum dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris ſtatim a paſtu facta ingeſtorum, vix mutatorum, dejectio.

G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intenſa dejiciendi cupiditate, et aſſiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

G. XX. EPHIDROSIS, *Hippocratis*. 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempeſtivitate peccantis, effluxus.

G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitioſus ex oculis humoris lachrymalis, ſebacei, vel purulenti effluxus.

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorraei.* Def. Med.

Humoris ſeroſi, mucoſive e naribus effluxus ſine ozaena, ſaepius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivae vel muci ſine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emiſſio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen.* in Aph. 8. lib. 5.

Muci, lymphae, vel cujuſcumque humoris facta cum tuſſi expectoratio conſtans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subito poſt paſtum potulentorum, cum magna ſiti per urinae vias, emiſſio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, ſaepius ardens, urinae emiſſio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentae, albeſcentis, aut viſcido-mucoſae materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHŒA, *Caſtell.* 267

Lex. *Bonet* Anat. Pr. Lib. 3.

Seroſo-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapſus.

G. XXX. GONORRHŒA. 268

Stillicidium fluidi ſeminalis ex urethra, aut ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cuſſon.* 269

Seminis in actu venereo ſtillatitia, tarda, impedita, et ad generationem inſufficiens, emiſſio.

G. XXXII. GALACTIRRHŒA. 270

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHŒA, *Linn.* gen. 271

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte poſtica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halituſve vitioſa emiſſio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per ſuperiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis ſtipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum, emiſſio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miaſmatum foetidorum exhalatio.

CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. TABES. 275

Macies cum amphimerina lenta ſine tuſſi.

G. II. PHTHISIS, *Graec.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tuſſi, dyſpnoea, et ut plurimum puris ſputo.

G. III. ATROPHIA. 277

Macies ſine febre.

G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumeſcentia univerſalis ab adipe moleſta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elaſtica et flatulenta cutis intumeſcentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumeſcentia, mollis, pallida, non elaſtica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgeſcentia mollis, non elaſtica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis a partibus ſolidis ſine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumeſcentia abdominis ab hypogaſtrio incipiens, opus generationis ſubſequens et partu terminanda.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores ſed non univerſales, a flui-

do intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel veſicae contento.

G. XI. HYDROCEPHALUS. 285

Tumor capitis, facie ſaepius excepta, mollis aut elaſticus, a fluidi intra ipſum congeſtione.

G. XII. PHYSOCEPHALUS. 286

Tumor totius capitis tenſus elaſticus ſub digito crepitans.

G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni.* 287

Tumor cyſticus ſero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaeſtheſia.

G. XIV. ASCITES. 288

Hydrops totius abdominis a fluido non elaſtico, ſeu gravis et fluctuoſus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hypogaſtrii in mulieribus ſucceſſive creſcens tumor, uteri figuram referens, preſſioni cedens, fluctuanſve, ab iſchuria et graviditate diverſus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Conſtans, permanenſque tumor levis, elaſticus, uteri figuram, et ſedem referens in mulierum hypogaſtrio.

291 G. XVII. TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, ſeu elaſticus et levis.

292 G. XVIII. METEORISMUS.

Inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Tumor hypogaſtrii ex urinae retentione ſaepius intra veſicam.

Species ſunt.

1. Iſchuriae renales.

Iſchuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. ſp. 1. *Schacht.* Inſtitut. med. pract. lib. VIII. cap. I. et VIII. *Gort.* Syſt. prax. med. de Iſchur. *Fabric. Hildan.* de Lithot. cap. IV. *Leal a Fonte,* Conſ. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. ſect. XXIV. obſ. IV. § 3. *Schenck.* lib. III. de Iſchur. falſ. cap. IV. et V. *Etmuller* Coll. pract. pag. 994.

Iſchuria (*Nephrolithica*) a renum calculo, S. ſp.

2. *Schacht*. lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort*. lib. citat. de morb. renum. *Car. Piſon*. de morb. a colluv. ſeroſ. *Schenck*. de Iſchur. *Bonet*. Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. et Medic. ſeptentrional. de Iſchur. Edinb. Eſſ. II. 31.

Iſchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. ſp. 3. *River*. Cent. I. obſ. 1. et 89. *Etmull. Schacht*. loco citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mict. *Ludwig*. Inſtit. med. clin. *Seb. Naſii* Specul. method. med. pag. 167.

Iſchuria (*Lunatica*) renalis lunatica, S. ſp. 4. *Tulp*. obſ. med. lib. II. cap. 49.

Iſchuria (*Nephroſpaſtica*) renalis ſpaſmodica, S. ſp. 5. *Schacht. Gort*. lib. citat. *Sydenh*. Diſſer. epiſt. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1715.

Iſchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminoſa, S. ſp. 6. *Gort*. lib. citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mict.

Iſchuria (*Nephrothromboides*) renalis a ſanguine congrumato, S. ſp. 7. *Mercat*. de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull*. de laeſ. urin. ſecret. pag. 314. *Fernel*. Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort. Gaub*. loc. citat.

Iſchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. ſp. 8. *Schenck*. lib. III. de ren. tumorib. *Gort. Gaub*. loc. citat. *Bonet*. Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sal. Diverſ*. de affect. particularib. cap. 14.

Iſchuria *(Nephrophlegmatica)* renalis petuitoſa ſeu mucoſa, S. ſp. 9. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Graſii* Ephem. natur. cur. ann. III. obſ. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de Iſchur. obſ. IV. V.

Iſchuria *(Nephroplegica)* renalis paralytodea, S. ſp. 10. *Sal. Diverſ. Mercat.* loc. citat. *Horſt.* tom. II. lib. IV. obſ. 49. *Marcel. Donat.* Hiſtor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epiſt. 18. 38. 39. *Hoechſtet.* Obſ. Dec. V. caſ. 20. *Claud.* Chaptal. pract. Monſpel.

Iſchuria *(Suppleta)* renalis ab alia evacuatione ſuppleta, S. ſp. 11.

a. A diarrhoea et ſudore, *Marcell. Donat.* Hiſt. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obſ. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex plat. pract. lib. III. part. VIII. ſect. II. cap. 9.

c. A perſpiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A ſudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Iſchuriae uretericae.

Iſchuria *(Ureteritica)* ureteritica inflammatoria, S. ſp. 12. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Ludwig.*

Inſtit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.* Inſtit. pract. de Iſchur. ſpur.

Iſchuria (*Ureterolithica*). Iſchuria ureterica calculoſa, S. ſp. 13. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Eſſais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſſ. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal.* *Diverſ.* loc. citat.

Iſchuria (*Uretro-thromboides*). Iſchuria ureterica, a ſanguinis grumo, S. ſp. 14. *Sal.* *Diverſ.* *Schacht.* *Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. I.

Iſchuria (*Uretro-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. ſp. 15. *Gort.* Prax. med. ſyſt. *Schacht.* *Sal.* *Diverſ.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sebaſt.* *Naſ.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan.* *Ferdinand.* hiſt. 97.

Iſchuria (*Uretoropyica*) ureterica purulenta, S. ſp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht.* *Sal.* loc. cit.

Iſchuria (*Ureteroſtomatica*) ab orificii ureterum inferioris clauſura, *Theod.* *Eller.* Miſcell. Berolin. tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. obſ. 17. *Lieutaud.* Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1753. *Franc.* *Sylv.* *Deleboe*, Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* obſ. anat. pag. 62.

3. Iſchuriae veſicales.

Iſchuria (*Cyſtitica*) a veſicae inflammatione, S. ſp. 18. *Schacht.* Inſtit. practic. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1704, 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III de urin. ſuppreſſ. *Foreſt.* lib. XXV. obſ. 27. 28. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. med. princ. lib. II. Hiſt. 150.

Iſchuria (*Cyſtolithica*) a veſicae calculo, S. ſp. 19. *Tulpii* obſerv. med. lib. IV. cap. 37. Eſſais d'Edinburgh, tom. IV. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. obſerv. 67. *Car. Piſonis* de morb. a colluv. ſeroſ. *Boneti* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. X. &c.

Iſchuria (*Cyſtoſpaſtica*) a ſphincteris veſicae ſpaſmo, S. ſp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebaſ. Naſii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de Iſchur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varendaei*, loc. citat.

Iſchuria (*Cyſtoplegica*) a veſicae paralyſi, S. ſp. 21. *Lieutaud.* Compend. medic. de Iſchur. *Zacut. Luſitan.* ex *Galeno* Hiſt. princ. hiſt. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serane* Theſ. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Luſitan.* Cent. IV. cur 10. *Pringle* Eſſais d'Edinburg, tom. I. artic. 32. Lond. Med. Obſ. I. 10.

Iſchuria (*Polyurica*) a veſica lotio diutius cohibito diſtenta, S. ſp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. § 384. pag. 336. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 14. *Nenter* de Iſchuria. *Paraei* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. ſect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandaei* de Iſchur. &c.

Iſchuria (*Cyſtopyica*) veſicalis purulenta, *Felic. Plateri Mantiſ.* obſ. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curioſ. tom. II. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. medic. princip. hiſt. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebaſt. Naſii* Specul. method. med. pag. XI. pag. 167. *Andre* des maladies de l'urethre, obſ. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Iſchuria (*Cyſtothromboides*) veſicalis a ſanguinis grumo, S. ſp. 24. *Claudini* conſult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. III. obſ. 66. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 20. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno* Hiſt. med. princip. hiſt. 145. et ejuſdem. Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Iſchuria (*Cyſtophlegmatica*) veſicalis a muco, S. ſp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Inſtit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de Iſchur. veſicat. *Amati Luſitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Luſitani*, Prax. med. admirab. lib. II. obſerv. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholin.* de urin. ſuppreſſ. obſ. 17.

Iſchuria (*Ectopocyſtica*) a veſicae ectopia, S. ſp. 26.

a. Herrnioſa, ſeu a cyſtocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. obſerv. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* obſ. pag. 830.

b. Proptoica, ſeu ab exocyſte, *Verdier* ex No. el. lib. citat. obſ. 17.

Iſchuria (*Cyſtoproctica*) veſicalis ab inteſtino recto, ſcybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abſceſſu, haemorrhoidibus turgente. *Dodonaei* Obſerv. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de Iſchur. obſerv. 6. *Wepferi* Diſſert. de Apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. 18. § 4. *Schacht. Gaubii*, loc. citat.

Iſchuria (*Hyſterocyſtica*) veſicalis ab utero, S. ſp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Diſſert. de Iſchur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. cap. XV. *Roderici a caſtro*, lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolani* de urin. ſuppreſſ. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* Pract. lib. IV. part. I. ſect. II. cap. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. falſ. *Schachtii*, *Gaubii*, loc. citat.

d. Tumoribus diſtento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac ſupra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

ε. Prociduo, *Nordmann.* Diſſert. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac ſupra, cap. XVI.

Iſchuria (*Atretarum*) urethrocyſtica a menſtruis in vagina retentis, S. ſp. 29. *Amyand* Tranſact. philoſ. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck.* lib. IV. de part. genit. mulier. obſerv. 9. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 951. *Aſtruc.* de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Iſchuria paradoxa, S. ſp. 30. *Morgagni* Epiſtol. *Le Clerc.* Journ. de med. Juill. 1755. p. 11.

4. Iſchuriae urethrales.

Iſchuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. ſp. 31. *Galen.* lib. de affect. loc. et ex eo *Zacuti Luſitan.* Hiſt. 149. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp.* Obſerv. med. lib. III. cap. X. *Foreſt.* lib. XXVI. obſerv. 2.

Iſchuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae impacto, S. ſp. 32. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obſ. 89. *Winckler.* ibid. tom. VI. obſ. 34. *Zacut. Luſitan.* Prax. med. admirab. lib. II. obſerv. 66. 67. 68. *Tulp.* Obſer. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. 14. *Barthol.* cent. IV. epiſt. 5. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Iſchuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. ſp. 33. *Bonet.* Sepulchr et medic. ſeptent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Luſitan.* cent. V. obſerv. 71. *Foreſt.* libr. XXV. obſerv. 25. *Varand.* de Iſchur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obſerv. 69.

Iſchuria (*Urethrothromboides*) a ſanguinis grumo urethram opplente, S. ſp. 34. *Bonet.* Med. ſeptentrion. de Iſchur. et ſepulchr. de urin. ſuppreſ. obſ. XI. *Foreſt.* lib. 25. obſ. 25.

Iſchuria (*Urethropyica*) a pure urethram obſtruente, S. ſp. 35. *Bonet.* Med. ſeptentr. de Iſchur. *Foreſt.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Iſchuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. ſp. 36. Hiſt. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1714, hiſt. pag. 22.

Iſchuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminoſa, S. ſp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam ſeptentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. ſpectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan. Rhodii* Centur. 3. obſerv. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obſerv. 77.

Iſchuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione, S. ſp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obſ. 54. *Foreſt.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. ver-

ſus finem. *Varand.* de affectib. ren. et veſic. cap. VII. *Bonet.* Medic. ſeptentr. de Iſchuria, cap. I. No. V. *Goulard.* de malad. de l'urethre. *Heiſter.* Chirurg. tom. 2. pag. 838. Lond. Med. Obſ. vi. 24.

Iſchuria (*Carunculoſa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. ſp. 39. *Amat. Luſitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critic. cap. IV. *Goulard.* des Malad. de l'urethre. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l'urethre, paſſim.

Iſchuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in ſcrotum hiante, S. ſp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miſcell. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 68.

Iſchuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. ſp. 41. *Fred. Hoffm.* Conſult. de morb. abdom. caſ. 105.

Iſchuria (*Perideſmica*) a vinculo ſtrictiori peni injecto, S. ſp. 42. *Bonet.* med. ſeptentr. de Iſchuria, cap. I. No. VIII.

Iſchuria (*Phimoſica*) urethralis a phimoſi, S. ſp. 43. *Horſt.* tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard.* de malad. de l'urethre, *Heiſt.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de Iſchur. obſ. XV.

Iſchuria (*Aſpadialis*) ab urethrae clauſura, S. ſp. 44. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horſt.* tom. II. obſ. 55. *Joan. Wieri* obſ. pag. 221. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſerv. XV. ſchol. et med. ſeptentr. de Iſchur. cap. 2. § 6.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen.* Synopſis.

Tumor ſcirrhoſus glandulorum colli, meſenteriique, cum labiis et naſo craſſioribus.

296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.

297 G. XXIII. LEONTIASIS.

Papillae ſetaceae vel corniculatae cutim exaſperantes.

298 G. XXIV. MALIS.

Tumores ſaepius purulenti, vel ulcera, cum inſectis vermiformibus, paſſim enata.

299 G. XXV. FRAMBÆSIA.

Excreſcentiae fungoſae, mori inſtar granuloſae ſaepius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici ſaepius contagioſi qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, &c. inducunt.

G. XXVI. SYPHILIS. 300

Poſt impurum concubitum ulcuſcula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegreſſa non raro gonorrhoea, dein puſtulae cruſtoſae, dolores nocturni, exoſtoſes, caries, &c. in caeteris partibus.

G. XXVII. SCORBUTUS. 301

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potiſſimum tibiarum.

G. XXVIII. ELEPHANTIASIS. 302

Facies deformis tuberibus calloſis, ozaena, raucedo, cutis elephantina craſſa unctuoſa, in extremis artubus anaeſtheſia.

G. XXIX. LEPRA. 303

Tubercula calloſa, ſcabie majora, vel cruſtis et ſquamis diffuſa, herpetica, per cutem diſperſa, pruriginoſa.

304 G. XXX. SCABIES.

Puſtulae cruſtoſae, lentis magnitudine, pruriginoſae manus potiſſimum obſidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Cruſtae flavae vel griſeae, ulceroſae, per caput diſperſae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inaſſuetus ſine pyrexia acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginoſus.

308 G. XXXIV. PHŒNIGMUS.

Rubor diffuſus, vel maculoſus ſine pyrexia.

G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falſo nomen Hippocrati tribuit. 309

Pallor, vel fuſcus color cutis, oculis minime flavis, ſaepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa claſſeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

G. XXXVI. PHTHIRIASIS. 310

Exortus pediculorum vel inſectorum pediculis affinium ex diverſis corporis partibus, quas prorigine, ulcuſculiſque defoedant, aut puncturis, pruritu diſcruciant.

G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii.* 311

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, ſaepius cum phthiriaſi.

G. XXXVIII. ALOPECIA. 312

Capillorum lapſus cum cuticulae deſquamatione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numeroſa vel ampla ulcera chronica, carioſa, foetida, cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida diſſolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, ſine tumore praevio, deinde vero exſiccatio, induratio, nigredo.

PARS SECUNDA.

GENERA

MORBORUM

DEFINITA,

Ab Illuſtri

CAROLO A. LINNE,

EQUTE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upſaliae 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

M O R B I.

Febriles (e ſanguine in medullam.)		
	EXANTHEMATICI	I
	CRITICI	II
	PHLOGISTICI	III
Temperati		
Nervini		
Senſationis	DOLOROSI	IV
Judicii	MENTALES	V
Motus		
	QUIETALES	VI
	MOTORII	VII
Fluidi ſecretionis		
	SUPPRESSORII	VIII
	EVACUATORII	IX
Solidi		
Interni	DEFORMES	X
Externi	VITIA	XI

EXANTHEMATICI Febris cum effloreſcentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinae hypoſtaſi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulſu duro, Dolore topico.

DOLOROSI	Doloris ſenſatio.
MENTALES	Judicii alienatio.
QUIETALES	Motus abolitio.
MOTORII	Motus involuntarius.
SUPPRESSORII	Meatuum impeditio.
EVACUATORII	Fluidorum evacuatio.
DEFORMES	Solidorum facies mutata.
VITIA	Externa palpabilia.

SYMPTOMATA ſe habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoſcitur Pulſu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctaenae (273) aliquot in Abdomine ſive Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) maligniſſima, funeſtiſſima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) ſeu *Bubones* (271) grangraenoſi (233).

Febris Synocha (12) acutiſſima, funeſtiſſima, Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Puſtulae (274) eryſipelaceae, ſuppurantes, eſcharoticae (280), deciduae, cicatriſantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evaneſcenti-furfuraceae.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (172), Tuſſis (155) ſicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido-lurida, ſuperficialia, inſenſibilia.

Febris exacerbans (23) Aſthenia (92), Agrypnia (130).

VI. SIPHYLIS.

Nodi (262) *Ulcuſcula*, *Myrmeciae* (279).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore oſtocopo (61), Marcore (209), Stranguria (196), Angina (46).

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immerſae, diverſicolores, confertae, intacta facie, pruriginoſae.

Febris Synocha (12), Sudore (207) foetido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dila-

bilia, pruriginoſa, fugacia, recidivantia, furfuraceo evaneſcentia.

Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. APHTHA.

Eſcharae (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae.

Febris Lenta (14) obſcura, cum Somnolentia (96).

III. SOLITARII.

X. ERYSIPELAS.

Macula rubens, urens, preſſione diſſimulanda, tumidiuſcula, ſuperficialis, dilatabilis, deſquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Eryſipelas* (10) eſt.

Dyſenteria (191) ad Contagioſos referreretur, modo Scabies (213) interna in oculos caderet.

Malignitatis ſymptomata imprimis ſunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anaeſtheſia* (118), *Lipyria*. *Carpologia* (135) *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda infra ſeptimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra ſeptimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XIV. QUOTIDIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nyċthemeris ſingulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nyćthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nyćthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyſmi ſimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyſmi diſſimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) *fit, aut potius* Rheumatiſmus (62).

Apyria *eſt deflagratio febris.*

Phthiſis (208) *poſſet poſt Hecticam* (24) *collocari, ſi ordo naturalis admitteret et expectoratio.*

Lethargus (98) *cum Febricula his affinis eſt.*

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum.*

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleurae.*

Febr. Synocha (12), Dyſpnoea (160), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Pleuritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi.*

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingeſtorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Inteſtini.*

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenſiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani.*

Febr. Proctica (59) cum Teneſmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Veſicae.*

Febr. Dolor Hypogaſtrii cum tumore inflammatorio, Dyſuria (57), Teneſmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali.*

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135), Aſthenia (92), Immobilitas, Anaeſtheſia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatio (231) *Faucis.*

Febr. Synocha (12), Tuſſis (155), Aglutitio

(164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumeſcentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis.*

Febr. Synocha (13), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Dyſpnoea (160), Interſcapulii dolor, Cubatus ſupinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Jecinoris.*

Febr. Amphemerina (20), Tuſſis (155) ſicca, Aſthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tenſio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis.*

Febr. Tetartophia (22), Reſpiratio interſecta (149), Hypochondrii ſiniſtri tumor pulſatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis.*

Febr. Synochus (13) irregularis, Nauſea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obſtipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris ſtupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri.*

Febr. Delirium (65), Spaſmus (121), Sardiaſis (125), Dolor hypogaſtrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis Externae.*

Febris ex partis externae tumore pulſatorio, Rubore tenſivo, calente.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent.*

Protypus Phlogiſticorum Phlegmone (39) *eſt.*

Delirium (65) *quaſi primus gradus Phrenitidis eſt.*

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tenſivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor preſſorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum ſuffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oeſophagi dolor rancido deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiae dolor ſcrobiculi ſubſyncopalis (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigaſtrii.

L. COLICA.

Inteſtini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii ſiniſtri, ſuſpiria (150).

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tuſſi (155), Haemoptyſi (179).

LV. HYSTERALGIA.
Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.
Renis dolor.

LVII. DYSURIA.
Veſicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.
Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.
Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.
Geniculorum dolor periodicus;
a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.
Articulorum dolor internus fixus;
a Pyrioſtio infecto.

LXII. RHEUMATISMUS.
Muſculorum dolor ad motum;
a Tunica celluloſa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vaſorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, *Scalpendi neceſſitatem inducens.*

Raphania (145) *dolore intenſio his affinis: Ob Spaſmos vero et Convulſiones ſequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.
Inſania acuta, tranſitoria, ſymptomatica cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.
Inſania acuta, periodica, ſine febre.

LXVII. AMENTIA.
Inſania chronica, univerſalis, innocua.

LXVIII. MANIA.
Inſania chronica, univerſalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.
Inſania chronica partialis, furibunda, meticuloſa, de Daemonibus.

LXX. VESANIA.
Inſania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.
Inſania chronica, partialis, moeſta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.
Perceptio *Soni* tinnitantis falſi.

LXXIII. PHANTASMA.
Perceptio *Viſibilis* objecti falſi.

LXXIV. VERTIGO.
Perceptio circumgyrationis falſae.

LXXV. PANOPHOBIA.
Imaginatio *mali* falſi in ſolitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.
Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Perſuaſio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.
Imaginatio *ſomniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.
Deſiderium *non Eſculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Deſiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Deſiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Deſiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Deſiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Deſiderium *Patriae* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Deſiderium *Choreae (ſaepe a morſuro inſecti.)*.

LXXXV. RABIES.

Deſiderium *Mordendi* lacerandique innocuos *ſaepe a Morſura Mammalis)*.

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Averſatio *Potulentorum* cum Rigore (141) et Sardiaſi (125); *(ſaepius praecedenti maritata)*.

LXXXVII. CACOSITIA.

Averſatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Averſatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Averſatio *mundanarum* rerum.

(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas conſtans muſculorum ponderoſa, quietem inducens.

XCI. LANGOUR.

Debilitas ſucceſſiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas ſucceſſiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus ſenſuſque ſubita; ſuperſtite Pulſu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapſus virium vitalium ſubitaneus; abolitis Pulſu, Reſpiratione, Senſu, Calore.

XCV. ASPHIXIA.

Lapſus virium animalium vitaliumque perſiſtens.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia conſtans, levis, febrilis, Delirio (65) oblivioſo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor conſtans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, reſpirationeque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, Reſpirationeque ſtertoroſa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor conſtans partium ſub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor conſtans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor conſtans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu formicationis.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Viſus obſcuritas ſine vitio ſenſibili.

CIX. CATARACTA.

Viſus privatio cum vitio obſervabili.

CX. AMAUROSIS.

Viſus privatio ſine vitio ſenſibili, pupilla dilata.

CXI. SCOTOMIA.

Viſus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Guſtus defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus ſenſationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muſcularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus diſtentio violenta, ſubitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis ſpaſtica intumeſcentia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Inteſtinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clauſura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio riſum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum preſſio ſub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis preſſione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum ſenſibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum inſenſibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, conſtans, flexilis, cum inſenſibilitate.

CXXX. AGRYPNIA.

Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua (*Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abſque frigoris ſenſu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viſceriſve motus ſubſultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum ſubſultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum ſubſultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inſcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio ſonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentiſſima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibuſdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum inſenſibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulſiva, cum ſenſibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio ſpaſtica, cum Agitatione convulſiva, Dolore violentiſſimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis ſibilans elocutio ab areſcentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis doloroſa exaltataque exclamatio.

Ad corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Expiratio profunda, agitatoria, cum Sardiaſi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inſpiratio interſecta, ſingultuoſa, cita, ſuſpirioſa, cum moeſtitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad Sanguinem intra pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inſpiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad ſanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, adaucta, hians, ſpaſmodica.

Ad ſanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inſpiratio profunda, preſſoria, cum extenſione corporis artuumque.

Ad ſanguinem per vaſorum anaſtomoſes propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inſpiratio celer, convulſiva, momentanea, iterata, ſonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Expiratio ſonora, convulſiva, celer, inſpirationi lentae ſuccedens.

Ad ſinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Expiratio ſonora, convulſiva, periodica

Ad Trachaeam evacuandum.

CLVI. STERTOR.

Reſpiratio ſonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium ſubigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Reſpiratio citatiſſima, profunda, levis, fugax.

Ad ſanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Reſpiratio anguſtatione faucium continua, ſine febre.

A Tracheae anguſtatione.

CLIX. EMPYEMA.

Reſpiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, poſt febrim.

A pure in cavum Thoracis effuſo.

CLX. DYSPNŒA.

Reſpiratio anheloſa (157), laborioſa, ſine ſenſu anguſtationis faucium.

A pulmonum ſubſtantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Reſpiratio ſtertoroſa (156), laborioſa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNŒA.

Reſpiratio ſuſpirioſa (150), ſuffocatoria (158), acuta, ſubitanea.

A ſanguinis per pulmones difficili tranſitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Reſpiratio profunda, ſuffocans (158), dormientis in dorſo cum Somnio laborioſo.

Ab Inteſtinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) Crepituſque (194) impeditus, cum abdominis intumeſcentia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Foecum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus.

CLXVIII. DYSMENORRHŒA.

Menſtrua ſuppreſſa ſ. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio.

CLXX. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

CLXXI. STERILITAS.

Geniturae ſuppreſſio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXII. OTORRHŒA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXIII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIV. HÆMORRHAGIA.

Naris ſanguineus fluxus.

CLXXV. CORYZA.

Naris mucoſus fluxus, copioſus, continuus,

CLXXVI. STOMACACE.

Oris ſanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVII. PTYALISMUS.

Oris ſalivalis e glandulis copioſiſſimus effluxus.

II. THORACIS.

CLXXVIII. SCREATUS.

Faucis muci ſonora evacuatio.

CLXXIX. EXPECTORATIO.

Pulmonis ſeroſa e Trachea evacuatio.

CLXXX. HÆMOPTYSIS.

Pulmonis ſanguinea cum Tuſſi evacuatio.

CLXXXI. VOMICA.

Pulmonis purulenta, copioſa, improviſa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXII. RUCTUS.

Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXIII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIV. VOMITUS.

Rejectio ingeſtorum convulſiva.

CLXXXV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (184) ſanguinis.

CLXXXVI. ILIACA.

Vomitus (184) cum Obſtipatione (166) fixa et Colica (50).

CLXXXVII. CHOLERA.

Vomitus (184) cum Diarrhoëa (188), Colica (50).

CLXXXVIII. DIARRHŒA.

Dejectio *Foecum* liquidarum frequens.

CLXXXIX. LIENTERIA.

Diarrhoea (188) Cibi immutati.

CXC. COELIACA.

Diarrhoea (188) Chymi.

CXCI. CHOLIRICA.

Diarrhoea (188) rubella, abſque Colica.

CXCII. DYSENTERIA.

Diarrhoea (188) cruenta, cum Colica (50), Teneſmo (194).

CXCIII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), abſque Colica.

CXCIV. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum deſiderio.

CXCV. CREPITUS.

Djectio *Flatuum* copioſa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCVI. ENURESIS.

Urinae ſtillicidium involuntarium, indolens.

CXCVII. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, doloroſa micturitio.

CXCVIII. DIABETES.

Urinae copioſiſſimae frequens micturitio.

CXCIX. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CC. GLUS.

Urinae viſcoſae micturitio.

CCI. GONORRHŒA.

Geniturae ſtillicidium.

CCII. LEUCORRHŒA.

Muci e ſinu muliebri efluxus.

CCIII. MENORRHAGIA.

Menſtruatio copioſa, inordinata.

CCIV. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laborioſiſſimus.

CCV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCVI. MOLA.

Maſſae carneae, intus cyſticoſae, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVII. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVIII. SUDOR.

Seri per poros copioſa, frequens ſudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCIX. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tuſſi (155), Dyſpnoea (160), Expectoratione (178) purulenta, copioſa.

CCX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *abſque Expectoratione.*

CCXI. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *abſque Expectoratione et Hectica.*

CCXII. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *abſque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXIII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; oſſibuſque ſaepe flexilibus,

II. TUMIDOSI.

CCXIV. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia.

CCXV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphyſematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVI. ANASARCA.

Corporis oedematoſa (230) intumeſcentia.

CCXVII. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematoſa (230) intumeſcentia, hiantibus ſuturis cranii.

CCXVIII. ASCITES.

Abdominis oedematoſa (230) intumeſcentia.

CCXIX. HYPOSARCA.

Abdominis nodoſa intumeſcentia.

CCXX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumeſcentia, conſtans, ſonora.

CCXXI. GRAVIDITAS.

Abdominis a foetu intumeſcentia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXII. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematoſus (230), cum debilitate, moerore.

CCXXIII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citta (78).

CCXXIV. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Laſſitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis (*Obſtipatio Bilis*).

CCXXVI. PLETHORA.

Rubedo corporis a diſtentis vaſis ſanguineis, cum Dyſpnoea (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anaſarca (216), *Aſcites* (218), *Hypoſarca* (219), *Hydrocephalus* (217), *Oedema* (230), *et Tympanites* (220)

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVII. ARIDURA.

Pars exſucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVIII. DIGITIUM.

Articuli exſiccatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intenſiſſimo.

CCXXIX. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam celluloſam Partis.

Tumore elaſticus, concolor, ſubdiaphanus, indolens.

CCXXX. OEDEMA.

Lympha ſtagnans intra tunicam celluloſam, Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, veſpertinus, indolens, Partis.

CCXXXI. SUGILLATIO.

Cruor effuſus in tunicam celluloſam.

Tumor obſoletus, latus, luridus.

CCXXXII. INFLAMMATIO.

Sanguis obſtructus in vaſis.

Tumor tenſus, calidus, ruber, pulſans, dolens.

CCXXXIII. ABSCESSUS.

Inflammatio ſuppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIV. GANGRÆNA.

Inflammatio ſ. Suppuratio ſuffocata, *mortua* ſerpens in tunica celluloſa.

Cutis livens, molliuſcula, putris cum veſiculis ſub epidermide, ſerpente vitio, margine ſubinflammato, ſubardente.

CCXXXV. SPHACELUS.

Gangraena (234) omnium ſolidorum partis.

Mortificatio putrida ad oſſa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.

(Solutiones Continui).

CCXXXVI. FRACTURA.

Oſſis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVII. LUXATURA.

Geniculi ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVIII. RUPTURA.

Tendinis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXIX. CONTUSURA.

Fibrarum ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXL. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copioſus e ſubſtantiae diſſolutione.

CCXLI. VULNUS.

Subſtantiae diſſolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLII. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLIII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutiſque *laceratione* factum.

CCXLIV. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis.*

CCXLVI. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eſchara (281).

CCXLVII. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVIII. INTERTRIGO.

Cuticulae eroſio madens dolenſque.

CCXLIX. RHAGAS.

Fiſſura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(Suppurationes apertae).

CCL. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnoſae.

CCLI. CACOETHES.

Ulcus *ſuperficiale* ſerpens, manans, perenne.

CCLII. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depaſcens, cicatricem inducens.

CCLIII. CARCINOMA.

Ulcus *Schirri* (284) ſuppurati.

Ulcus putridum, ſerpens, vaſis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIV. OZENA.

Ulcus intra antrum *Highmori*.

Ulc. ocultum e Naribus foetens.

CCLV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloſo vaginatum*.

Ulc. ſinuoſo penetrans, intus cortice obtectum, ore anguſtatum.

CCLVI. CARIES.

Ulcus *Oſſis* ſeparato perioſtio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, ſanie paſſim nigra ſe prodens.

CCLVII. ARTHROCACE.

Ulcus *Medullae* cum oſſis Carie (256).

Ulc. malignum, tumens, dolore oſtocopo (61).

CCLVIII. COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem receptum.

Partis ſtigma dolore furioſo.

CCLIX. PARONYCHIA.

Serum corruptum ſub *tendinibus* perioſtioque.

Partis rubor dolentiſſimus, os deſtruens.

CCLX. PERNIO.

Partis uſtio *Gelu* facta.

Pars albo caeruleſcens, tempeſtatibus recrudeſcens, ſaepe exulcerans.

CCLXI. PRESSURA.

Digiti inflammatio (232) a *frigore*, in caſum unguis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in ſuppurationem vergens.

CCLXII. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem ſecans.

Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXIII. LEPRA.

Puſtulae (275), Eſchara (281) ſicca colorata, cum *Nodis* immerſis mobilibus indolentibus fuſcis Rhagadibuſque (249).

CCLXIV. TINEA.

Puſtulae (275) *Capillitii* ſiccae, eſchara (281) albo-flaveſcente, *Piliſque* abbreviatis erectis bulboſa-radicatis.

CCLXV. ACHOR.

Puſtulae (275) exulcerantes, manantes communi pinguedinoſo.

CCLXVI. PSORA.

Puſtulae (275), ichoroſae, eſcharoticae (281), noctu imprimis pruriginoſae (64).

CCLXVII. LIPPITUDO.

Puſtulae (275) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVIII. SERPIGO.

Puſtulae (275) ſiccae, obſoletae, ſerpentes, ſubfarinaceo-deſquamantes.

CCLXIX. HERPES.

Puſtulae (275) eſcharoticae (281), baſi communi eryſipelacea (10).

CCLXX. VARUS.

Puſtulae (275) *Glandularum ſebacearum* rubrae diſperſae, chronicae.

CCLXXI. BACCHIA.

Vari (270) *faciei* cum nodis maculiſque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXII. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in ſuppurationem tendens.

CCLXXIII. ANTHRAX.

Glandula ſubcutanea inflammata, in ſuppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, eriſipelaceus (10), immerſus, dolentiſſimus, ſuppurandus apice acuto, puſtula purifera.

CCLXXIV. PHLYCTÆNA.

Veſicula ſeroſa, diſtenta, pellucida, baſi inflammata, rupta dolens.

CCLXXV. PUSTULA.

Veſicula purulenta, turgens, dehiſcens pure.

CCLXXVI. PAPULA.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix ſuppurandum.

CCLXXVII. HORDEOLUM.

Tuberculum cyſticoſum, ovatum, in limbo palpebrarum, ſuppurans ſaepius apice.

CCLXXVIII. VERRUCA.

Papilla nervea intumeſcens, indurata.

Papula durior, ſcabra, ſicca, indolens.

CCLXXIX. CLAVUS.

Verruca (278) calloſa, in Tendinibus radicata, baſi ſenſibilis.

CCLXXX. MYRMECIUM.

Verruca (278) madida, mollis, denudata.

CCLXXXI. ESCHARA.

Cruſta mortua, ab humoribus extravaſatis coagmentata, decidua.

V. TUMORES Protuberantes.

CCLXXXII. ANEURISMA.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulſans, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. VARIX.

Venae dilatatio.

Tumor mollis, quieſcens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIV. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, aſper, concolor, indolens, rotundatus, preſſione inſenſilis.

CCLXXXV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, ſolidiuſculus, preſſione obtuſe ſentiens.

CCLXXXVI. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliuſculus, indolens, abſque cyſtide.

CCLXXXVII. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capſulaeque tenſione expreſſa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulpoſus concolor.

CCLXXXVIII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulpoſus indolens.

CCLXXXIX. NATTA.

Tumor tunicatus, muſculis irradicatus, eminens, pulpoſus, indolens.

CCXC. SPINOLA.

Tumor ſupra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, Vertebrarum proceſſibus dehiſcentibus.

CCXCI. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *oſſe* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCII. HERNIA.

Inteſtini obtecti ultra propriam ſedem protruſio.

CCXCIII. PROLAPSUS.

Viſcus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIV. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCVI. PTERYGIUM.

Cuticula excreſcens e cantho oculi, ſuperficiem ejus obtegens.

CCXCVII. ECTROPIUM.

Palpebra inferior reſupinato-inverſa.

CCXCVIII. PHIMOSIS.

Praeputii intumeſcentia inflammata, glandem denudans incarceranſve.

CCXCIX. CLITORISMUS.

Clitoridis intumeſcentia extra ſinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCC. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCCI. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCII. LORDOSIS.

Oſſium incurvatio.

CCCIII. DISTORTIO.

Oſſium ad latus non naturale flexio.

CCCIV. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCV. STRABISMUS.

Oculi diſtorti et inaequaliter moti.

CCCVI. LAGOPHTHALMIA.

Oculi ſurſum viſio palpebra ſuperiore abbreviata.

CCCVII. NYCTALOPIA.

Oculi viſus nocturnus.

CCCVIII. PRESBYTIA.

Oculi viſus remotus.

CCCIX. MYOPIA.

Oculi viſus approximatus.

CCCX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in ſuis alveolis.

CCCXI. LAGOSTOMA.

Labium ſuperius oris ſiſſum.

CCCXII. APELLA.

Praeputii abbreviatio abſque inflammatione,

CCCXIII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIV. PLICA.

Capillorum contortuplicatio indiſſolubilis,

CCCXV. HIRSUTIES.

Pili copioſiores longioreſque.

CCCXVI. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVII. TRICHIASIS.

Ciliorum diſtortio.

VIII. MACULÆ.

CCCXVIII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes conſolidatas.

CCCXIX. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXX. MORPHÆA.

Macula *alba*, depreſſa, lata.

CCCXXI. VIBEX.

Lineae *ſanguinicolores* ſubcuticula.

CCCXXII. SUDAMEN.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, evaneſcentes.

CCCXXIII. MELASMA.

Macula *caeruleſcens* in parte tecta.

CCCXXIV. HEPATIZON.

Macula *griſea*, ſubaſpera, pruriens.

CCCXXV. LENTIGO.

Maculae *griſeae*, confluentes, inſenſiles.

CCCXXVI. EPHELIS.

Color *fuſcus* partis inſolatae.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, maliſque
Tot ſumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

THEORIA.

1. CORPUS vivum conſtat *Medullari* cerebroſo, et *Corticali* ſolido fluidoque.
2. VITA ſentiens movenſque reſidet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arcte cuſtoditum, nervis expanſis tentaculatum, fabricat ſuum corticale ſolidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec viciſſim per ſolida praeparat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuiſſimo ſpirituoſo liquido corticali, ſed *flagrat* electrico pulmonibus hauſto.
5. Medullare ſentiens ſe pandit ad *gratum* ſalutare, et movens ſe retrahit ad *ingratum* noxium.
6. Fluidum corticale, e quo ſolida, ſolvitur deſtruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utriſque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum reſiſtit ſentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab aceſcente, *Phlogiſticae* a putreſcente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.

8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare ſtudet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculoſiora, eo citius, per datam ſic portam, ſimul ejecit quaevis impura; ſed duas portas ſimul apertas non facile admittit, ne exhauriatur *.

9. Quidquid praecipue adverſum ſentit, praecipue curat vel minora majoribus adſociat †, ut tota ſe his apponat.

10. CORTICALE ſolidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta* eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverſe, unde defectus, *Morbi* dicti.

11. MORBI tolluntur contraria cauſſa ‡; hanc ut citius natura obtineat, Toxica miſceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

* Evacuationes duae ſimul et ſemel poſſunt vix ſtare.

† Dolor dolorem trahit.

‡ Morbi morbis curantur.

12. CONTRARIA haec ex ſapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoſcenda ſunt: E contrariis itaque ſaporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae.*

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

		Agunt in *Corticalae* Vitale: in *Fluidis*.	in *Solidis*.		
1	AQUOSA.	Mundificantia,	Humectantia.		
		Abſorbentia,	Exſiccantia	SICCA.	1
2	ACIDA.	Refrigerantia,	Attenuantia.		
		Balſamica,	Tonica	AMARA.	2
3	DULCIA.	Edulcorantia,	Impinguantia.		
		Incidentia,	Corrodentia	ACRIA.	3
4	VISCOSA.	Inviſcantia,	Lubricantia.		
		Penetrantia,	Abſtergentia	SALSA.	4
5	PINGUIA.	Obtundentia,	Emollientia.		
		Inſpiſſantia,	Adſtringentia	STIPTICA.	5

II. OLIDA.

		Agunt in *Medullare*	Animatum.	
Senſum	*Excitant*	AROMATICA,	*Sopiunt*	VIROSA.
Motum	*Spaſticant*	ORGASTICA,	*Evacuant*	NAUSEOSA.
Judicium	*Acuunt*	SPIRITUOSA,	*Confundunt*	TETRA.
Libidinem	*Provocant*	AMBROSIACA,	*Suffocant*	HIRCINA.

PARS TERTIA.

DEFINITIONES

GENERUM

MORBORUM

A Clariſſimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUJUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

TABULA CLASSIUM MORBORUM.

I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris ſiccitate et gravitate corporis.

II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES. Excernendorum ſuppreſſiones.

IV. DOLORES. Senſationes moleſtae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.

V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. ADYNAMIÆ. Senſationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES. Senſationes auctae, vel perverſae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in ſuperficie corporis conſpicuae.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliiſque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æſtus ad ſummum 18 horas perdurat, dein aliquandiu ceſſat, poſteaque revertitur praevio frigore.

I. *SIMPLICES.*

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, ſequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, diende biduum intermittit, quarto iterum redit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo ſexto die repetit.

VI. SEPTANA.

Singulo ſeptimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio poſt decimum diem, ſed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. *DUPLICATÆ.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, acceſſionis vero tempora alternis diebus reſpondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre

vacuum habet, et acceſſionis tempora alternatim praecedenti inſultui reſpondent.

III. *TRIPLICATÆ.*

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxyſmis quarto quovis die conſpirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, ſed remiſſiones ſaltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *SIMPLICES.*

XV. QUOTIDIANA continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulſu magno et frequenti, criſi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* eſt.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore

incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium conſtans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris ſenſus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentiſſima, tertio quoque die acerbior, cum immenſa ſiti, et ſicciſſima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profuſiſſimo ac perpetuo ſudore inde a primo die, et magno virium lapſu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus ſpecies ſunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua ſopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum ſopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulſus parvus et obſcurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decurſum crebri horrores rigoreſve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio uſque ad criſin ſingultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus eſt, et implacide moleſteque habet, vel faſtidio agitatur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminoſa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia ſe intermiſcet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averſatione liquidorum, ſingultu, convulſione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oſcitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginoſa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagioſa, acutiſſima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut veſiculae oriuntur cum leipyria, ingenti ſiti, ſpiritu, ſudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nauſea, vomitu, pulſuque parvo ac obſcuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis ſicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae ſubſidentia.

II. *COMPOSITÆ.*

1. *Exanthematicae.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagioſa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, ſenſim in puſtulas purulentas, eſcharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagioſa, cum tuſſi ſicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, lateſcentes, paulum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuiſſimas ſquamulas ſolvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut ſenſus punctorius in dorſo, crure, ac inteſtinis, aut ſtupor in digitis, puſtulae prurientes milii ſeminis magnitudine, rubrae vel albae, ſero primum limpido, deinceps ſubalbo perlarum colore non diſſimili, plenae, facie intacta, ſudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morſibus pulicum fere ſimilia, flaveſcentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis ſubflavis ad inſtar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in ſquamulas dehiſcentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, veſiculae ſero ſublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA*.

Variolae ſpuriae; ephemera, puſtulae variolis ſimillimae, prurientes, primo die erumpentes et ſuppurantes, tertio reſiccatae, et in ſquamulas deciduae, toto morbo intra ſeptem dies ad ſummum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae puſtulas in ore, phlyctides dictas, generat.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis ſub ſpecie varioloſae poteſt, niſi ad decurſum accuratiſſime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis exiſtimantur.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcuſculis in ore ſuperficialibus, fungoſis, mucoſis, quas aphthas vocant.

II. *INFLAMMATORIÆ.*

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae ſigna vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut ſuper corneam feratur, acerbus dolor, perverſio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis

in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, reſpirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tuſſis ſicca, dyſpnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtuſus, gravativus, tuſſis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus anguſtiave.

LII. MEDIASTINA.

Mediaſtini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad ſternum in inſpiratione, reſpiratio frequens, tuſſis cum ſputis coloratis, orthopnoea; an ſemper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediaſtina, urgente morbo ſyncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, ſymptomata fere ut in peripneumonia, ſed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulſus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an ſemper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyſpnoea, dolor e regione ventriculi cinguli inſtar ventrem ſupra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigaſtrio, ſitis, vomitus ingeſtorum, ſingultus.

LVII. ENTERITIS.

Inteſtini inflammatio; febris aſſodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et ſtercoris retentio, aut dyſenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua hypochondrii dextri dolor tenſivus, tuſſis ſicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio ; febris continua, hypochondrii ſiniſtri diſtentio atque tumor, dolor pulſans, moleſtus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Meſenterii inflammatio ; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae ſimilis, egeſtiones chyloſae et ichoroſae, nullo doloris ſenſu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio ; febris continua cum dolore et tumore in regione epigaſtrica et hypogaſtrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio ; febris aſſidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. MYOCOLITIS.

Muſculorum abdominalium inflammatio ; ſymptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca flammea, vel nulla, ſtupor cruris vicini, dolor teſtis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Veſicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogaſtrii dolor ardens, preſſorius, frequens meiendi ſtimulus, iſchuria, teneſmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogaſtrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, eryſipelatis expulſionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, ſynochos, cum dolentiſſimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, teneſmus.

III. *SYMPTOMATICÆ.*

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae ſuperveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Veſpertina, catarrhis ſocia.

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatiſmo juncta, multus ſudor, interdum puſtulae purulentae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor ſpinae, haemorrhoides, aut ſaltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri ſuperveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum

in ſuppurationes tranſeunt, ſuperveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum ſudore colliquativa et phthiſi.

II. PROFLUVIA.

I. *HÆMORRHAGIÆ.*

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profuſio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profuſio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tuſſim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHŒA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulſi eruptio.

LXXXVII. OTORRHŒA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejuſve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; ſanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHŒA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquoſa rubella inſtar loturae carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profuſio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae ſanguine urinae exquiſite permixto perfunditur; ut ea quaſi dilutus et tenuis ſit ſanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e veſica dolorifica, qua ſanguis urinam non aequaliter perfundit, ac in imo ſubſidens in grumos concreſcit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides veſicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis ſine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor ſanguineus; ſanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profuſio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola ſubſequente.

II. *APOCENOSES.*

XCVIII. CATARRHUS.

Tuſſis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lachrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum ſeri tenuioris deſtillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus; catarrhus auris ſordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copioſa ſalivae profuſio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copioſa puris aut ſanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tuſſim.

CV. DIARRHŒA.

Copioſum ſinceriorum humorum ex alvo profluvium, ſine vehementi ſenſu doloris.

CVI. PUORRHŒA.

Puris ſinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminoſa ac teneſmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas inteſtinorum qua, quae per alvum deſcendunt, alimentis aſſumptis ſubſtantia et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quaſi chyli aut cremoris ſpecie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitus bilioſi multi alvique dejectiones, cum periadynia,

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco ſtercoris, excretio diuturna, cum contabeſcentia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae ſincerae et cruentae ex alvo excretio teneſmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria conſtans, ſine acrimoniae et doloris ſenſu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorſus aqueae excretio, in morbo ſpaſtico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, ſub quo corpus contabeſcit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucoſae, albae, paucae, et quaſi verminoſae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHŒA.

Invita ſeminis, liquoris, proſtatarum, ichoris,

citra venerem, citra libidinis inſomnia, citraque colis tentiginem, profuſio.

CXIX. LEUCORRHŒA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profuſio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda ſeminis ex rigido cole profuſio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis ſtillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, ſtimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene ſonora, ſpiritu nonnihil difficili, qui nec niſi hiante ori duci poteſt.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita ſupra infraque expulſio, cum intumeſcentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

CXXX. AMENORRHŒA.

Menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus,

IV. DOLORES.

CXXXIV. ANXIETAS.

Moleſta ſenſatio circa praecordia, quae praeſentem rerum ſtatum faſtidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad ſcalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Senſus frigoris dolorificus in parte muſculoſa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et muſculorum dolor. *Lumbago*, *iſchias*, *gloſſagra*, et *pleurodyne Sauvag.* ſunt ſpecies.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorum dolor; cujus ſpecies *chiragra* et *gonagra*.

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum ſenſu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tenſivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Moleſtia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium ſtupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX. ACATOPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae craſſities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejuſdem ſolito major longitudo et gracilitas.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum ſenſu ponderis et pulſatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces aſſurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus diſtentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens ſpaſticus, cum nauſea ſaepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in ſtomacho cum inextinguibili ſiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi deſiderium.

CLX. COLICA.

Dolor ſpaſticus inteſtinorum cum obſtipatione, nauſea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in inteſtino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae denſae rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae ſtillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina ſubſidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuoſa, dolorifica deſidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucoſa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvageſ.* et *Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium ſimilis.

CLXX. DYSMENORRHŒA.

Profluvium ſanguinis uterini menſtruum dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laborioſus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui ſine arte prorſus abſolvi non poteſt.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis ſtimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities ſcroti cum intenſa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in oſſe fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus oſſium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vaſorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyroſis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut ſolius cervicis diſtentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud poſſit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem diſtentio, ſed qua corpus in poſteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, ſed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione ſenſuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri ſingularis concuſſio; ſine frigoris ſenſu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalgeſcunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem et violentior cum triſmo et ſenſu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulſiva univerſalis, chronica, periodica, cum oppreſſione ſenſoriorum, exituque ſpumae ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepſia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva, continua, chronica, cum integritate ſenſuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. RAPHANIA, *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulſio ſaltatoria aut procurſiva. *Tarantiſmus* eſt ſpecies.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extenſio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigeſcentia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, ſine inflammatione. *Angina convulſiva et Suffocatio hyſterica* ejus ſunt ſpecies.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extruſio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Lingua violenta, acuta, revulſio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum conſtans agitatio; malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perverſio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occluſio ſpaſtica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii ſuperioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulſiva, impetuoſam aëris inſpirationem, ſimilemque mox expulſionem per nares cum ſtrepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulſiva et ſonora aëris e pulmonibus expulſio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter ſe colliſorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *ſ. Spaſmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *ſ. Spaſmus Cynicus.*

Spaſmus muſculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *ſ. Riſus Sardonius.*

Involuntarius riſus, ſub quo animus non gaudio, ſed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in inſomnio terrifico, reſpirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inſpiratio convulſiva ſubitanea velociſſima, ſonora recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, viſceris, muſculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculi incluſi per os exploſio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os viciſſim maſti-

candus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. ŒSOPHAGISMUS, *ſ. Spaſmus Oeſophagi.*

Ciborum deglutitorum in oeſophago ſubſiſtentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum ſpaſmis ventriculi ac inteſtinorum, variiſque congeſtionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *ſ. Æſtus volaticus.*

Subitus fugaxque aeſtus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et conſtans incurvatio.

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa ſenſatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. ASTHENIA.

Langour aut debilitas corporis.

CCXXIV. TORPOR.

Senſus motuſque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAMIA.

Impotentia, qua ſe aegri nullo modo movere aut in lecto erigere poſſunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Senſus motuſve aut utriuſque defectus in ſingulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyſis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionem animalium ceſſatio, cum ſtertore et magno pulſu.

CCXXX. CATALEPSIS, *ſ. Catoche.*

Subita functionem animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum ſitum, qui ipſis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtertore conſervans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *ſ. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipſum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in ſomnum juſto major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram ſuperiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Viſus imbecillitas, integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae viſioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Caecitas ſine ſenſibili oculorum labe, praeter mydriaſin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Caecitas cum obſcurata lente, retro pupillam conſpicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Caecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Caecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneae obſcuritas, viſum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Viſus noctu ſaltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Viſus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Viſus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Guſtus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obſcuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum ſtridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aſpera et obſcura, quae vix niſi a prope adſtantibus exaudiri poteſt.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi ſolet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox naſalis, quae ex naribus haud ſimul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaeſitas.*

Vitioſa literarum ſ et r pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut litera aut ſyllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo ſyllaba ſyllabae cito copulari non poteſt.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo ſermo praecipitatur, unaque ſyllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inſpiratio lenta, profunda, gemibunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oſcitatio cum artuum extenſione.

CCLXV. APNŒA.

Reſpiratio adeo rara et parva, ut plane ſpiritus periiſſe videatur.

CCLXVI. MACROPNŒA.

Reſpiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNŒA.

Reſpirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Reſpiratio difficilis periodica, chronica, cum ſenſu anguſtiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNŒA.

Reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus ſuffocativus.*

Difficillima reſpiratio, cum ſubitanea ſenſu-

um motuſque interceptione, ſtertore, pulſuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, ſ. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, ſ. *Ronchus.*

Sonus ſtertoroſus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita ſenſus motuſque interceptio, cum ſudore frigido, tinnitu aurium, pulſu ac reſpiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulſu, nulla reſpiratione perceptibili, abolitoque omni ſenſu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulſus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficiliſque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia ſine faſtidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauſeabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum viſu, olfactu, aut guſtu percipiendarum, talis averſatio, ut ex earundem perceptione gravia ſymptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obverſantium, quae non adſunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua ſubito viſui omnia nigra ſe repraeſentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruſcans.

CCXCI. DYSOPIA.

Viſus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non exiſtentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum ſemetipſo circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus deſiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu ſubſequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non eſculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi aſſumendi, aut rei olfaciendae vehemens deſiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Senſus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium ſubter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido ſqualidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido vireſcente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obſcure rubra, tingente immiſſa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum ſubnigro cutis colore, urina de nativo ſtatu haud decedente.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, ſine febre lenta et hectica.

CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at ſine dyſpnoea et tuſſi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyſpnoea, et tuſſi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyſpnoea et effuſione aquae intra pectus, ſtrepitum concuſſione intus facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphyſium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumeſcentia, aquoſa, mollis, digiti impreſſi veſtigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, ſcroti, et crurum aquoſus, cum atrophia ſuperiorum partium. Abdomen impulſum ſonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

* In *atrophia* ſola pinguedo abſumitur, nec aeque reſtituitur; in *tabe* et *phthiſi* caro ſimul minuitur.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops ſaccatus pleurae, peritonaei, aut viſceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulſatione ſonitum edens, cum obſtipatione et atrophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogaſtrii ab utero flatu diſtento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum laſſitudine, maculis artuum lividis, ſtomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagioſa ex contagio venereo, cum tumoribus oſſium et ulceribus faucium partiumque obſcoenarum, praegreſſis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPRA, *Graecorum, ſ. Pſora.*

Pertinaciſſima ſcabies totius corporis vel partis, ſicca, dura, aſpera, ſerpentibus puſtulis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, ſ. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, ſaniem foetidam cruſtoſam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA, *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, *ſ. Rhopaloſis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoſo ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo poſſint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copioſe emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis longa, a magnitudine habituve viſceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno ſitu foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum puſtulis ichoroſis; ſenſus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars ſenſum motum et innatum calorem tota amiſit, ſitque prorſus nigra, mollis, putris, et cadaveroſa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, conſternatio, triſtitia, deſperatio.

CCCXXX. DELIRIUM, *Paraphroſyne.*

Mentis alienatio in febre haud conſtans, nec furibunda. *Carpologia* ejus eſt ſpecies.

CCCXXXI. MANIA.

Inſania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *ſatyriaſin* pro ſpeciebus habeo.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Inſania longa cum moeſtitia ac timore. *Noſtalgia* ejus ſpecies eſt.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Inſania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Exceſſus mentis qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa cauſa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Eſt veluti cum quidam in ſacris faciendis

mente capiuntur, ſi qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Moroſis, Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, ſeu quaedam ignavia, citra delirium et ſoporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occaſus atque privatio, qua jam ab ipſo ortu affecti vix mentis inopia loqui diſcunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Viſum, quod in ſomno occurrit, tanquam verum ſit exiſtimatum. *Pavor* ejus eſt ſpecies.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo aſſurgit, ambulat, et diverſa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. *INFLAMMATIONES.*

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae ſplendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Eryſipelas cum eminentibus ardentibus puſtulis. *Zoſter* dicitur, ſi abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in ſummitate digitorum.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerſo.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab uſtione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio, aut oedematodes tumor praeputii, quo glans nudari non poteſt.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non poſſit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. *TUMORES.*

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi ſaltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apoſtematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quaſi malignus furunculus, qui partem mox

adurit, puſtulas circum ſe ardentiſſimas ciet, tandem cruſta nigra nel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, qua excidente ulcus cavum ſordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam ſubſtantiam converſio.

CCCLV. ONYX.

Abſceſſus inter corneae laminas.

CCCLVI. HIPPOPYON.

Abſceſſus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abſceſſus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegreſſa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, ſimplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minuſque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute ſubito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra fugaciſſima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula punċturis urticarum ſimilia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et meſenterii indolens obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejuſdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, liveſcens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumoriſve ſpecie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus ſpecies *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini inſidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculoſus, materiam ſpiſſam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praeſertim in tibiis enaſcens, humorum glutinoſum et ſubrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. ŒDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumſcriptus aut diffuſus, preſſo digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorſum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monſtroſus tumor a collecta aqua in cute aut ſubter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo ut is palpebris operiri non poſſit.

CCCLXXXVI. SPINA, *bifida.*

Tumor aquoſus exiguus, in nucha aut inferiore ſpinae loco, poſterioribus vertebrarum dehiſcentibus proceſſibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem conſiſtente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus teſtis comprehenditur, aquoſus.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti.*

Tumor tunicae ſcroti celluſolae aquoſus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumeſcentia pinguedinoſa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumeſcentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in ſingulari parte ab aëre celluloſam cutis habitum ingreſſo formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae veſicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Inteſtini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo muſculi obliqui ab ingreſſo inteſtino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in ſcroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab inteſtino infra ligamentum Poupartii elapſo.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis.*

Hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori et interna femoris parte prope perinaeum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacro-iſchiatica elapſo.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia inteſtini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia veſicae per muſculi obliqui annulum, ſub quạ urina nonniſi preſſo exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioſo et hydropico compoſitus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus, aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulſans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque ſpermaticarum inaequalis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipſo illo, poſt paſtum auctus, dolore ſtomachi, vomitionibuſque ſtipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquoſus et varicoſus tumor vaſorum teſtis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Teſtis ſarcoma aut ſcirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in oſſe circumſcriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius oſſis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor oſſis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana incluſus, et materiam ſpiſſam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Teſtudo*, *Talpa*, *Meliceris* ejus ſpecies.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obſcuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea diſrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. *EXTUBERANTIÆ**.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum ſupra cutim durum, aſperum, ſeſſile vel penſile. Unde ſpecies *Acrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obſcoenis mollis, madida, tactu dolens.

* Extuberantiae ſupra cutim eminent; tumores intra aut ſubter eam exiſtunt.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, calloſum, in digitis plantiſque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *ſ. Tylloma.*

1. Obdurata ſumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae ſine ſenſu eſt, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumeſcentia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungoſum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excreſcentia corneae tunicae inhaereſcens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excreſcentia, membranulae forma, rubra ſupra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abſceſſum fere deſinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere ſuperiori innaſcens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere calloſum, diſperſum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Roſacea.*

Varus quaſi confluens, cum rubedine aſpera maculoſa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Aſperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. *PUSTULÆ et PAPULÆ.*

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Puſtula ardens alba, ſubrubra aut ſublivida, ſanie ſubcruenta repleta, ciceris aut fabae

magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Puſtula ſubflavo humore diſtenta, lucida, illi ſimilis, quae ab ambuſtione erumpit, non manifeſto dolens. In capite *Pſydracium* vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, *Serpigo.*

Papula ardens, cutem ſepentibus minimis puſtulis erodens. *Purpura ſcorbutica*, quam vocant, veriſſima *ſerpigo* eſt.

CCCCXLIV. SCABIES.

Durities cutis rubicundior, ex qua puſtulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ſicciores, ſaniem rodentem, exulcerantem, cruſtas formantem, et contagioſam complexae.

CCCCXLV. AQUULA.

Puſtula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem ſubſtrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa*, *Sudamina.*

Puſtulae milii magnitudine, aquoſae ſine ru-

bore et ſine ullo dolore, ex ſudoribus repente ſparſim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Puſtula purulenta ex macula rubra in ſynocho emergens, contagioſa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Puſtula ſimilis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagioſa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Puſtula pruriens, ſeminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Puſtula ab uſtione contracta.

V. *MACULÆ.*

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a ſanguine per cutem quaſi effuſo livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melaſma* ſpeciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculae pulicum morſui ſimiles, magnitu-

dine et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, lateſcentes, et plerumque confluentes, inque ſquamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, ſubflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fuſca, multiplex, in facie potiſſimum et in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae ſubtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini ſimiles pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula ſubrubra aſpera, dura, ſicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. *DISSOLUTIONES.*

1. *Apoſpaſmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis ſolidae, mollis a cauſa mechanica, cum effluxu ſanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis ſolidae, mollis, internae, ab interna cauſa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Diſſolutio oſſis tranſverſa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Oſſium longorum concuſſio et contorſio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depreſſa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio oſſis ex articulo ſuo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab oſſe paulum recedit, eaque inter ſe dehiſcunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Diſſolutio cuticulae et cutis a compreſſione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Ptiryaſis.*

Reſolutio cutis in tenues ſquamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abraſio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Oſſis corrupti ſquamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species ſolutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis muſculorumque conquaſſatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut ſubſtantiae manifeſtam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Eroſio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiſcens a viva carne, et in cruſtam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis deſtructio et caſus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque calloſis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computreſcit, atque mollis et cadaveroſa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri converſio in ulcus, quod nigrum eſt, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus ſerpens, ſed ſolam cutem rodens ac depaſcens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, ſed et vicinas exedit et abſumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excreſcit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, anguſtum, calloſum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab anguſto ore orſum intus curvatum ampliatur, ſine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in oſſe cum ſubſtantiae et perioſtei corruptione, qua os ſpongioſum et friabile redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuſula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinoſa ſanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA, *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, ſed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli ſimilis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus muſculoſis, articulis, et plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod denſiſſimam, duriſſimam, aridiſſimamque cruſtam facit, ſerpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus converſum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exſtillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, ſuperficiaria, mucoſa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a ſudoris vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio ſcroti laxati.

VII. *CONCRETIONES.*

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter ſe conglutinatio.

DV. ZYNIZESIS.

Pupillae concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus ſubjectis, loquelam, ſuctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extenſio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et faſtigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia ſpinae dorſalis, omoplatae, oſſiumve thoracis. Ejus ſpecies *Cyphoſis*, *Lordoſis*, *Scolioſis*, et *Seiſis*.

DXIII. CAPUT *obſtipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum diſtortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium ſuperioris palpebrae, ſi illa parum deſcendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obverſio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum ſurſum attollitur, ſed hiat, aut extrorſum everſa eſt.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inverſio introrſum.

DXX. RHŒAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et ſordes, quae in ſenili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Diviſum ſemel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Oſſium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginoſa pilorum ſuperficies, quaſi pulvere ſint conſperſi.

DXXVIII. PHALACROTIS:

Pilorum caſus, qui tabeſcentibus et ex morbo graviore convaleſcentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiaſis* ejus ſpecies, item *Calvities* et *Pelada.*

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie calloſa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DLXI. ISCHNOTIS.

Exceſſiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrſum verſa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorſum diſtorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus*, *Plautus*.

Cui pedum medium ab interiori parte non eſt cavum, ſed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum eſt, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, ſed inferne ſub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHŒAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exeſa effluit.

DXLIX. ATRETA.

Cujus anus aut naturalia occluſa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu eſt anguſtus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus teſtis aut ambo abſconditi.

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitioſa naturalium conformatio, ita ut utriuſque ſexus adeſſe videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae oſſeae, quaſi cornua, naſcuntur.

DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod ſuperfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevis.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Maſſa carnea, fibroſa, vaſculoſa, ex utero excreta. - Ovum deforme.

Nec ſilentio prorſus tranſeunda ſunt vitia quaedam occulta, quae non niſi in cadaverum ſectione ſe offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viſcerum, oſſeſcentiae cartilaginum, membranarum, muſculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vaſorum, poſitura viſcerum perverſa, bullae aëreae in venis et pulmonum ſuperficie, aneuriſmata aortae, anguſtiae praeternaturales vaſorum et ductuum, ipſorumque concretiones.

PARS QUARTA.

SYSTEMA MORBORUM SYMPTOMATICUM,

AUTORE

CLAR. JO. BAPT. MICH. SAGAR,

MED. DOCT. &c. &c.

Viennae, 1776.

CLAVIS CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

Symptomata externa levidenſia, palpabilia, abſque notabili cachexia, pyrexia.

ORDO I. MACULÆ.
II. EFFLORESCENTIÆ.
III. PHYMATA.
IV. EXCRESCENTIÆ.
V. CYSTIDES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. DEFORMITATES.

CL. II. PLAGÆ.

Continui ſolutiones, morbi proprie chirurgici perſaepe ſat graves.

O. I. SOLUTIONES recentes plerumque cruentae.
II. SOLUTIONES artificiales recentes cruentae.
III. SOLUTIONES incruentae.
IV. SOLUTIONES anomalae.

CL. III. CACHEXIÆ.

Coloris, figurae, molis, in corporis habitu ſine notabili febre, depravatio.

O. I. MACIES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. HYDROPES PARTIALES.
IV. TUBERA.
V. IMPETIGINES.
VI. ICTERITIÆ.
VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

CL. IV. DOLORES.

Senſationes moleſtae ad febres non referendae.

O. I. DOLORES VAGI.
II. DOLORES CAPITIS.
III. DOLORES PECTORIS.
IV. DOLORES ABDOMINIS.
V. DOLORES EXTERNARUM.

CL. V. FLUXUS.

Exitus inſolitus cujuſvis ſolidi, vel fluidi, e corpore eſt character hujus claſſis.

O. I. SANGUIFLUXUS.
II. ALVIFLUXUS ſanguinolenti.
III. ALVIFLUXUS non ſanguinolenti.
IV. SERIFLUXUS.
V. AERIFLUXUS.

CL. VI. SUPPRESSIONES.

Meatuum impeditio, hinc excretionem conſuetarum in ſanitate retentio.

O. I. SUPPRESSIONES egerendorum.
II. SUPPRESSIONES ingerendorum.
III. SUPPRESSIONES imi ventris.

CL. VII. SPASMI.

Contractio invita conſtans, vel interpolata muſculorum motum localem efficientium

O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

II. SPASMI TONICI GENERALES.

III. SPASMI CLONICI PARTIALES.

IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

CL. VIII. ANHELATIONES.

Motus ſpaſmodici iterati, defatigantes, pectoris cum reſpiratione ſonora, moleſta, abſque pyrexia notabili.

O. I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.

II. ANHELATIONES OPPRESSIVÆ.

CL. IX. DEBILITATES.

Impotentia ſentiendi, appetendi, imaginandi, organa artuſque movendi more ad ſanitatem neceſſario.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.
II. ANEPITHYMIÆ.
III. DYSCINESIÆ.
IV. LEIPOPSYCHIÆ.
V. COMATA.

CL. X. EXANTHEMATA.

Febris cum efflorescentia cutis varia maculoſa, puſtuloſa, phlyctaenoidea, et aſthenia.

O. I. EXANTHEMATA contagioſa.
II. EXANTHEMATA non contagioſa.

CL. XI. PHLEGMASIÆ.

Febris cum pulſu duro, dolore topico, inflammatione partis externae vel internae, ſanguine miſſo cruſta inflammatoria tecto, urina plus tincta.

O. I. PHLEGMASIÆ muſculoſae.
II. PHLEGMASIÆ membranaceae.
III. PHLEGMASIÆ parenchymatoſae.

CL. XII. FEBRES.

Frigus, calor, pulſus frequens, reſpiratio aucta, viribus artuum imminutis, depravatis, vel viribus vitalibus pulſu et reſpiratione vix mutatis, virium artuum ſumma proſtratio.

O. I. FEBRES CONTINUÆ.
II. FEBRES REMITTENTES.
III. FEBRES INTERMITTENTES.

CL. XIII. VESANIÆ.

Error mentis in imaginatione, appetitu, judicio, aut memoria.

O. I. HALLUCINATIONES.
II. MOROSITATES.
III. DELIRIA.
IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

CLASSIS I.

ORDO I. MACULÆ.

Mutationes coloris nativi.

Genus I. LEUCOMA. 1

Macula corneae pelluciditatem vitians, opacans.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymboſa cum cutis depreſſione, locum fixum non ſervans in quo naſcatur.

G. III. EPHELIS. 3

Maculae umbrinae glabrae, corymboſae, raro partes tectas afficientes, acquiſitae.

G. IV. NÆVUS. 4

Macula congenita eminens, vel non, ſupra libellam cutis.

G. V. ECCHYMOMA. 5

Eſt macula nigricans, vel atro-rubra, caerulea, liveſcens, in gilvum ſucceſſive deſinens colorem, nata a ſanguine in adipoſam ſub cute effuſo.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Aſpredines, cum cuticulae elevatione ultra libellam cutis humorales, exiguae, gregales, abſque pyrexia.

6 G. VI. PUSTULA.

Phyma aut veſicula colorata ſuppurans, diametri linearis, faſtigiata, pure dehiſcens, quandoque in cruſtam abiens ; eſt ſeu *furunculus* linearis diametri.

7 G. VII. PAPULA.

Phyma parvulum ſeu efflореſcentia deſquamanda, nec ſuppurans.

8 G. VIII. PHLYCTHÆNA.

Veſicula parva fluido ſeroſo plena, quae deinde ſponte rumpitur et fundit ſerum.

9 G. IX. BACCHIA.

Maculae rubrae, vel effloreſcentiae naſi et partium adjacentium eidem, guttatae plus, minus prominentes, aſperae, furfuraſcentes, diuturnae ; hoc genus ambigit inter maculas et effloreſcentias.

G. X. VARUS. 10

Tumor piſi magnitudine plerumque ſat durus, non ſuppurandus, aut deſquamandus, pertinax in glandulis ſebaceis. L.

G. XI. HERPES. 11

Papularum prurientium corymbus in ſquamas furfuraceas fatiſcentium.

G. XII. EPINYCTIS. 12

Phlycthaenarum atro-rubrarum congeries, maxime in tibiis, noctu potiſſimum acriter prurientium.

G. XIII. HEMEROPATHOS. 13

Papulae rutilae crura obſidentes, extra lectum illico apparentes, importune prurientes, in lecto evaneſcentes, diuturnae.

G. XIV. PSYDRACIA. 14

Effloreſcentia eryſipelatoſa abſque febre notabili.

G. XV. HYDROA. 15

Exanthemata granis milii magnitudine et forma ſimilia ſubito exorta, phlycthaenoidea, fugacia, abſque aſthenia, pyrexia, et

praegreſſa oppreſſione praecordiorum, miliaria multis habita.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales ſolitarii.

16 G. XVI. ERYTHEMA.

Phyma rubrum calens, diffuſum, ſine febre.

17 G. XVII. ŒDEMA.

Phyma album, frigidum, indolens, molle, foveam ex preſſione ſervans plerumque.

18 G. XVIII. EMPHYSEMA.

Phyma cuti concolor elaſticum, ex preſſione aut percuſſione crepitans.

19 G. XIX. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, gravans, frigidum, in partibus glanduloſis enatum, dum externum cuti quoque concolor obſervatur.

20 G. XX. INFLAMMATIO.

Eſt tumor ſphaeroideus rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſolitarius,

pleruṃque ſat extenſus, in ſuppurationem ſponte vergens; eryſipelas non ſuppurat, et phlegmone habet ſemper pyrexiam conjunctam manifeſtam; inflammatio ſaepius in phlegmone tranſit, vel phlegmone eſt gradus major inflammationis.

G. XXI. BUBO. 21

Phyma ſcirrhoſo-phlegmonoideum in glandulis inguinalibus.

G. XXII. PAROTIS. 22

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonoideus parotidis glandulae, in ſuppurationem lentiſſime vergens.

G. XXIII. FURUNCULUS. 23

Tumor inflammatorius cutaneus, ſeu ſubcutaneus, prominens, profunde ruber, ſphaeroideus, cujus centrum occupat vortex fibroſus digere neſcius; ordinario juglandis habet magnitudinem.

G. XXIV. ANTHRAX. 24

Phyma apice gangraenoſum, et in radio inflammatum.

25 G. XXV. CANCER.

Phyma ſcirrhoſum lancinans, vel phyma lancinans venis varicoſis profunde rubris, nigris, lividis obſitum, cinctum, facile ſanguinantibus.

26 G. XXVI. PARONYCHIA.

Inflammatorius tumor extremi digiti, cum dolore ſaepius perterebrante, calore, tenſione, et ſubinde cum rubore.

27 G. XXVII. PHIMOSIS.

Tumor fere ſemper inflammatorius praeputii glandem incarcerans, aut excludens ad coronam hancce vinciendo.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis per ſuccum nutritium copioſiorem advectum, &c. in hos converſum.

28 G. XXVIII. SARCOMA.

Excreſcentia carnis conſiſtentiam fere habens, plerumque rubra.

G. XXIX. CONDYLOMA. 29

Eſt excreſcentia eminens, vel non eminens, firmior carnibus et cute, mollior contra oſſibus, non elaſtica.

G. XXX. VERRUCA. 30

Excreſcentia cutanea prominens, vix ſenſibilis, indolens, praerupta ſeu aſpera ſuperficie.

G. XXXI. PTERYGIUM. 31

Eſt excreſcentia carnea, vel membranceo-vaſculoſa ad oculi canthum in globo oculi exorta, alam expanſam utcunque referens, verſuſve corneam ſeſe extendens, creſcens.

G. XXXII. HORDEOLUM. 32

Tumor durus, aut excreſcentia plus, minus mollis, plerumque cuti concolor, ferme ſenſu carens, in limbo palpebrarum enata, magnitudine ſaepius granum hordei vel piſi aequans.

G. XXXIII. TRACHELOPHYMA. 33

Eſt tumor varius, non purulentus, neve inflammatorius, anticae partis colli.

34 G. XXXIV. EXOSTOSIS.

Tumor oſſis partialis, vel aliquando totius oſſis, ut ſubinde in minoribus ſit, ad oſſa accedens.

O. V. CYSTIDES.

Tumores capſulati fluido referti.

35 G. XXXV. ANEURYSMA.

Cyſtis arterioſa cruore referta, ex pulſu et ſitu noſcenda.

36 G. XXXVI. VARIX.

Dilatatio venae rubra, nigreſcens, ad preſſionem recedens, iterumque ſubito rediens hac ceſſante, plerumque pruriens, mordicans.

37 G. XXXVII. MARISCA.

Tumor in margine ani, ex ſanguine in textum vaſorum minimorum varicoſorum effuſo efformatus, ruber, dolens, variae formae et magnitudinis. Vide Haemorrhoidem. L.

G. XXXVIII. HYDATIS. 38

Cyſtis lymphaeductuum dilatatorum, lympham vel ſerum continens.

G. XXXIX. STAPHYLOMA. 39

Cyſtis corneae, ex dilatatione ejuſdem ectopia uveae in cameram oculi anteriorem prolapſae; hoc genus magis ad Ectopias ſpectat. Vide Caliginem. L.

G. XL. LUPIA. 40

Eſt cyſtis materiem pultis, vel mellis conſiſtentiam referentem continens, haud purulentam, indolens, cuti concolor, loco mobilis.

G. XLI. HYDARTHRUS. 41

Hydrops vel in capſa articulari, vel in cellulis vicinis, haud in tunica propria; tumor eſt fluctuans ſine coloris mutatione, pulſatione.

G. XLII. APOSTEMA. 42

Cyſtis purulenta, vel ichoroſo-purulenta; noſcitur ex fluctuatione, praegreſſa inflammatione, albedine, remiſſione doloris et pulſationis.

43 G. XLIII. EXOMPHALUS.

Cyſtis umbilicalis, fluido quopiam repleta, abſque ectopia.

44 G. XLIV. OSCHEOPHYMA.

Cyſtis ſcroti variis fluidis turgens.

O. VI. ECTOPIÆ.

Partium ſolidarum e ſua ſede dimotio, ſenſibus obvia, continentibus has relaxatis.

45 G. XLV. EXOPHTHALMIA.

Ectopia oculi.

46 G. XLVI. BLEPHAROPTOSIS.

Eſt palpebrae utriuſque, vel alterutrius, morboſa elongatio, retractio, intro vel extra verſio, cum ſymptomatis cuique ectopiae propriis.

47 G. XLVII. HYPOSTAPHYLE.

Eſt procidentia ſeu elongatio uvulae relaxatae, inflammatae, ulceratae, incraſſatae, attenuatae, vel bicornis.

48 G. XLVIII. PARAGLOSSA.

Eſt linguae magnitudo minuta, vel aucta; vel plane ſoluto, aut elongato frenulo, in fauces ejuſdem revolutio.

G. XLIX. PROPTOMA. 49

Eſt procidentia appendicum externarum inſolita et morboſa, diverſa a praedictis.

G. L. EXANIA. 50

Sphincteris ani, vel et inteſtini recti inverſi procidentia extuberans, rubra, reducibilis ſemper extra ſtrangulationem.

G. LI. EXOCYSTIS. 51

Veſicae inverſa membrana interior, ſoluta a reliquis per urethram foras pendet, et en exocyſtis!

G. LII. HYSTEROPTOSIS. 52

Eſt uteri procidentia tumorem ſiſtens in vagina, vel quandoque extra genitalia pendentem, undique liberum, menſes ſtillantem, ſaltem initio reponibilem, cum doloribus hypogaſtrii, inguinum, urinae difficultate, animi deliquiis; haec omnia tactus obſtetricius definit.

G. LIII. COLPOPTOSIS. 53

Tumor in ſinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur ſubinde una tantum ruga vaginae) per quod foramen digitus immiſſus altius o-

rificium uteri, uterumque in ſua quaſi ſede abſque colpocele deprehendit, reponibilis; torquet inſuper aegram dyſuria, teneſmus.

54 G. LIV. GASTROCELE.

Eſt tumor in ſcrobiculo cordis vulgo dicto, vel ad minus ſupra umbilicum inſolitus, hernioſus, ventriculum, aut alia viſcera illapſa, continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorſali ſponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum undecunque orta natus, vomitum cauſſans.

55 G. LV. OMPHALOCELE.

Tumor hernioſus ad umbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione integumentorum et peritonaei natus, varia viſcera continens.

56 G. LVI. LAPAROCELE.

Tumor hernioſus, ventralis ſeu abdominalis, in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato.

57 G. LVII. MEROCELE.

Túmor hernioſus, in ſuprema et anteriore parte femoris, ad exitum vaſorum crura-

lium in foeminis praecipue obſervabilis, proprietates herniarum habens; vidi merocelen etiam in viro.

G. LVIII. BUBONOCELE. 58

Tumor herniosſus emergens per annulum vaſorum ſpermaticorum, ſenſim enatus, cuti concolor et indolens, abſente ſtrangulatione.

G. LIX. OPODEOCELE. 59

Eſt tumor hernioſus in ſummo femine adlatus, genitalium egrediens per ſinuoſitatem oſſis iſchii ſuperiorem, vaſis tranſmittendis dicatam; in foeminis prope alterum vulvae labium viſitur haec ectopia; reponibilis, cuti concolor, mollis; dum parvus eſt tumor, vix obſervatur, ſubin eſt elaſticus. T. I. Auctorum Chirurgicorum Pariſ. p. 709. conſule L.

G. LX. ISCHIOCELE. 60

Eſt hernia emergens per inciſuram oſſis ſacri, ſeu hiatum inter os ſacrum et tuber oſſis iſchii, decubitu prono reponibilis; rarum genus, et ſat adhuc obſcurum.

61 G. LXI. COLPOCELE.

Eſt tumor cherniofus in vagina emergens, reponibilis, in decubitu ſupino natibus elevatis ſponte recedens plerumque, indolens, abſque ſignis aliorum tumorum qui hic enaſci ſolent.

62 G. LXII. PERINÆOCELE.

Tumor herniofus in perinaeo ad unam vel alteram, aut plane utramque, ut vidi in parvula puella, partem, raphes, mollis, reponibilis, cuti concolor; ſubin eſt effectus dyſtociae; ſpecies hujus generis veſicalis, inteſtinalis, omentalis, patent una cum therapeia ex prioribus.

63 G. LXIII. PERITONÆORIXIS.

Sunt herniae omnes jam deſcriptae ob rupturam peritonaei natae; rixis vero peritonaei ſigna ſunt, crepitis in violentia aliqua majore peritonaeum lacerante, herniae alicujus ſubita et magna protuberantia, eruptio; dolor in loco rixis major aut minor; ſpecies ſunt hujus generis tot, quot genera jam numeravi herniarum. Hernia eſt extenſio praeternaturalis peritonaei et integumentorum cavum formans,

recipiens viſcera adjacentia; praeter praedictus hernias dantur herniarum varietates: Sic dantur herniae partiales inteſtinales, ubi media pars fiſtulae inteſtinalis cavum hernioſum ingreditur, altera parte libera in abdomine manente; dantur herniae accretae, in quo caſu pars illapſa cavi hernioſi peritonaeo accreſcit; cavum hernioſum quandoque praeter viſcera illapſa liquorem in abdomine collectum continet; ſaepius quoque partes cavum hernioſum ingreſſae incarcerantur a ſpaſtice contracto annulo, unde ileus naſcitur, quem vidi ſuo loco. Peritonaeorexis pertinet quidem ad rupturam; ſed, propter affinitatem ejuſdem cum herniis, hic eandem ſubjunxi.

G. LXIV. ENCEPHALOCELE. 64

Eſt cerebri, aut cerebelli, vel utriuſque ſimul, per hiatus oſſium cranii necdum ſat cohaerentium, ectopia hernioſa, relaxata pariter lamina utraque durae matris et piae externa tenuiſſima pellucida; ſymptomata ſubin non magna, ſubin contra graviſſima cauſſans.

65 G. LXV. HYSTEROLOXIA.

Eſt uteri gravidi, vel non gravidi, in abdomine ſitus ſeu directio aberrans a directione naturali axeos ſuae, noſcenda ex orificii uterini directione mutata, palpo externo abdominis, cum aliis ſymptomatis inconſuetis; ut iſchuria, dyſuria, enureſi, obſtipatione, &c.

66 G. LXVI. PARORCHIDIUM.

Eſt teſticuli unius, vel utriuſque, a ſitu naturali aberratio.

67 G. LXVII. EXARTHREMA.

Eſt ſeparatio contigui in oſſium articulis per diarthroſin combinatorum, noſcenda ex impotentia ad motum, mutatione nativae conformationis, dolore, protuberantia inſolita, cavitate, muſculorum tenſione, converſione artus, accuratione membri, vel prolongatione.

68 G. LXVIII. DIASTASIS.

Oſſium receſſus junctorum per raphen, harmoniam, ſynchondroſin, aut ſyndeſmoſin, cognoſcibilis cavitate inſolita uno in loco, in altero vero tumore, mutatione poſitu-

rae, et reliquis ſymptomatis oculo et tactui patentibus.

G. LXIX. LOXARTHRUS. 69

Eſt oſſium articulatorum ſitus relativus in alienum conſtanter mutatus, ſeu obliquitas reſpectiva perſiſtens citra exarthrema et ſpaſmum. Vide Subluxationem et Diſtorſionem.

G. LXX. GIBBOSITAS. 70

Eſt oſſium pectus, vel pelvim componentium, indecora prominentia a tumore, luxatione, diaſtaſi, torſione, preſſione, aut alio principio nata.

G. LXXI. LORDOSIS. 71

Oſſium longiorum fiſtuloſorum circa medium inflexio, incurvatio, ectopia a linea recta.

O. VII. DEFORMITATES.

Sunt vitia quae vix ſanitatem laedunt.

G. LXXII. LAGOSTOMA. 72

Labium oris fiſſum.

73 G. LXXIII. APELLA.

Eſt praeputii, vel alterius appendicis mollis, brevitas, parvitas.

74 G. LXXIV. POLYMERISMA.

Partium numerum ordinarium exceſſus.

75 G. LXXV. EPIDOSIS.

Appendicum mollium incrementum inconſuetum ſanum : Species ſunt penes praelongi, auriculae pendentes, praepùtia lòngiſſima, clitoriſmus, caro pubis foeminarum Africanarum, naſones, labia tumida oris, &c.

76 G. LXXVI. ANCHYLÒMERISMA.

Eſt partium concretio.

77 G. LXXVII. HIRSUTIES.

Pili copioſiores, longiores, vel in locis ubi non ſolent creſcere obvii, dant ideam hujus generis.

CLASSIS II.

PLAGÆ.

Char. Classis. Continui ſolutiones, morbi proprie chirurgici perſaepe ſat graves.

ORDO I. SOLUTIONES.

Recentes, quaſi ſemper cruentae.

G. I. VULNUS. 78

Eſt continui ſolutio molli in parte hians, labiata, cruenta, ab inſtrumento mechanico ſcindente facta; corneae vulnus cruorem non fundit.

G. II. PUNCTURA. 79

Continui ſolutio intus extenſa tantum, eaque inſtrumento pungente facta caſualiter.

G. III. SCLOPETOPLAGA. 80

Eſt vulnus a glandibus e bombardis, aut ſclopetis exploſis illatum, vaginatum, decurſum glandis deſignans, oblongum, vexatum.

G. IV. MORSUS. 81

Eſt plaga recens, quam animalia dentibus inferunt mordendo.

82 G. V. EXCORIATIO.

Eſt epidermidis a cute, vel cutis a carnibus ſeparatio, detractio.

83 G. VI. CONTUSIO.

Eſt partis cujuſcunque mollis, vel ſolidae, in minimis vaſculis, fibris attritio, fractio ſolutio.

84 G. VII. RUPTURA.

Membranarum, tendinum, aut ligamentorum dialyſis per tenſionem facta, vires horum excedentem; Conſule chirurgos, et de utero rupto Cl. Henricum Crantz, ingenii excitatiſſimi virum; huc pertinet peritonaeorixis.

O. II. SOLUTIONES.

Recentes, cruentae, et artificiales.

85 G. VIII. OPERATIO.

Eſt ſtudioſa ſolutio continui ad aliquid eximendum, ut lithotomia; operatio reipſa eſt vulnus ſtudioſa et dextra manu factum chirurgi, morbum relinquens hujus claſſis.

G. IX. AMPUTATIO. 86

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

G. X. SUTURA. 87

Eſt ſtudioſis puncturis mediante acu factis, filiſque per puncturas trajuctis, ſolutorum mollium contractio, adductio; ſutura ſicca fit emplaſtris, quae huc non ſpectat, quum non ſit plaga.

G. XI. PARACENTESIS. 88

Eſt artificialis punctura in aliquod cavum corporis, plerumque acu triquetra cannulata facta.

O. III. SOLUTIONES.

Incruentae, nec ad priores referendae, pus, ſaniem, cariem, &c. ſiſtentes.

G. XII. ULCUS. 89

Eſt vulnus ſuppuratum partis mollis, vel ſolutio continui mollis antiqua, pus, ichorem, aut ſaniem quamcumque alens, fundens.

90 G. XIII. EXULCERATIO.

Eſt excoriatio ſuppurans, ſeu ulcus ſuperficiale, reliqua, quae ad hoc genus ſpectare videntur, ex ulcere patent.

91 G. XIV. FISTULA.

Eſt ulcus cortice calloſo vaginatum, ore anguſtatum, oblongum.

92 G. XV. SINUS.

Eſt cavitas ulceroſa ampla, ſaepe multiplex, ore anguſto non calloſo, vel plane nullo donata.

93 G. XVI. ESCHARA.

Cruſta mortua ſicca partis mollis ſaepius cauſticis facta eſt eſchara, ſenſus et vitae expers.

94 G. XVII. CARIES.

Oſſis eroſio cava, aſpera, perioſtio denudata, plerumque nigra; unde os evadit fragile, friabile, vel exfoliabile: Species numerat hoc genus ſequentes; eſt nimirum caries ſicca, humida, exfoliabilis, ſyphilitica, ſcorbutica, ſcrophuloſa, varioloſa.

G. XVIII. ARTHROCACE. 95

Ulcus medullae ab interioribus ſponte natum, cum oſſis carie, exoſtoſi, et perſaepe dolore; ſpecies numerat hoc genus fere totidem quot caries; vulgo vocatur ſpina ventoſa: Conſule ſuper hac Petit de morbis oſſium.

O. IV. SOLUTIONES

Anomalae, quae prioribus includi renuunt.

G. XIX. RHAGAS. 96

Eſt ſolutio continui ſicca in partium mollium marginibus, ut labiis oris; ſpecies includit Rhagas veneream, malignam, peſtiferam, frambaeſiacam, ulceroſam, benignam, lixivialem, glacialem, &c.

G. XX. AMBUSTIO. 97

Eſt plaga a flamma ignis, corporibuſque ex igne candentibus, liquidis ferventibus, aut radiis ſolis in focum coactis, noſtro corpori illata, ſuccedentibus phaenigmo, phlycthaenis, vel eſchara.

98 G. XXI. FRACTURA.

Eſt diviſio oſſium in fragmenta ſeparabilia.

99 G. XXII. FISSURA.

Diviſio oſſium rimam referens, haecceve non penitus ſeparans.

CLASSIS III.

O. I. MACIES.

Diminutio voluminis corporis ex conſumptione pinguedinis, vel ſanguinis defectu.

G. I. TABES. 100

Eſt macilentia univerſalis, cum pyrexia lenta et habituali, citra tuſſim puriſve anacatharſin.

G. II. PHTHISIS. 101

Corporis emaciatio, cum amphimerina lenta, tuſſi, dyſpnoea, et ut plurimum puris ſputo: Ab initio rarius in phthiſi adeſt puris ſputum, in Statu contra et fine ſemper. Quid eſt proprie pus?

G. III. ATROPHIA. 102

Eſt macies ſine tuſſi, anacatharſi, et febre notabili; raro equidem eſt atrophia ſine omni febricula. Conſule definitionem febris.

G. IV. HÆMATAPORIA. 103

Macies ſeu cachexia ex inopia ſanguinis. Deſcriptio: Virium debilitas, pertinax

aurium ſibilus, anorexia, facies lurida epidelio tecta, pallidiſſima, alvi fluxus, diabetes, ſudores profuſi, lipothymiae, tibiae tumidae, ſubin hydrothorax his ſuccedens, vigiliae, ſuſpiria, animi abjectio, moeror, mortis timor, urina pallida, venae abditae, pulſus vacuus, ſanguinis profluvia praegreſſa, ſunt ſigna haemataporiae; aliquando aër evolutus locum ſanguinis in vaſis occupat.

104 G. V. ARIDURA.

Macies, exſiccatio unius tantum artus, vel partis corporis, ſine febre.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas ex volumine, mole, auctis.

105 G. VI. PLETHORA.

Intumeſcentia univerſalis, proportionata, et aequabilis, ex abundantia ſanguinis. Deſcriptio: Amyſtidis et ventris cultus, pulſus plenus aut ſuppreſſus, venarum amplitudo conſpicua: Æſtus et gravitas totius corporis, reſpirandi difficultas, laſſitu-

do ſpontanea, ſtupor artuum, ſomni turbati, partes epidelio tectae ruberrimae, temperamentum ſublaxum, ſanguineum.

G. VII. POLYSARCIA. 106

Intumeſcentia univerſalis, mollis, pallidula, ab adipe nimium aucto.

G. VIII. PNEUMATOSIS. 107

Intumeſcentia univerſalis ab aëre, ad attactum crepitans, elaſtica, laevis.

G. IX. ANASARCA. 108

In tumeſcentia univerſalis oedematoſa, non elaſtica, veſtigium digiti impreſſi ſervans, pallida, frigida, haud crepitans.

G. X. PHLEGMATIA. 109

Intumeſcentia oedematoſa artuum inferiorum mollis, cuti concolor, indolens, foveam digiti impreſſi ſervans, non elaſtica.

G. XI. PHYSCONIA. 110

Eſt intumeſcentia abdominis a partibus ſolidis praeternaturalis, ſine graviditate, fluctuatione, et elaſi, ad tactum dura, reſiſtens, parenchymatica.

111 G. XII. GRAVIDITAS.

Intumeſcentia abdominis ex imo hypogaſtrio incipiens, in axique ejuſdem aſcendens, opus generationis ſubſequens, partu terminanda; pathemata gravidarum, menoſtaſia, mutationes oris tincae, motus infantis ſenſibilis, ſunt totidem characteres hujus generis.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores a fluidis in cavitatibus congeſtis, ut abdomine, &c.

112 G. XIII. HYDROCEPHALUS.

Hydrops capitis a ſero.

113 G. XIV. PHYSOCEPHALUS.

Eſt tumor totius capitis emphyſematoſus elaſticus, ſub digito premente crepitans.

114 G. XV. HYDRORACHITIS.

Tumor cyſticus ex hiatu vertebrarum lumbarium, vulgo ſpina bifida, in recens natis protuberans cum anaeſtheſia; eſt verus hydrops thecae ſpinalis. A.

G. XVI. ASCITES. 115

Gravis, ſphaeroidea, et fluctuoſa abdominis intumeſcentia, non elaſtica, cum polydipſia, urina pauca, lixiviali, lateritia.

G. XVII. HYDROMETRA. 116

Tumor hypogaſtrii ſine graviditate, ab utero fluidis diſtento, rotundus, fluctuans, leges gravitatis ſequens; dolor inguinum, ſpirandi difficultas, menoſtaſia, rigores, mammarum mollities, phlegmatia, et tactus orificii uterini, diagnoſin firmant.

G. XVIII. PHYSOMETRA. 117

Eſt conſtans tumor hypogaſtrii a flatu uterum diſtendente, rotundus, elaſticus, laevis, in ſede uteri.

G. XIX. TYMPANITES. 118

Eſt intumeſcentia totius abdominis, laevis et elaſtica, a pulſatione ſonum edens, cum ructibus, borborygmis, conſtipatione, et doloribus abdominis; chronicus eſt hic morbus.

119 G. XX. METEORISMUS.

Eſt intumeſcentia flatulenta epigaſtrii, hypochondriorum, vel totius abdominis, fugax et plerumque indolens.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum externi, non hydropici, cachexia.

120 G. XXI. RACHITIS.

Eſt deformitas nata ex articulorum tumore duro, carnium marcore et flacciditate, capitis mole, ſterni protuberantia; ingenium praecox in infantibus, oſſiumve flexilitas et lordoſis.

121 G. XXII. SCROPHULA.

Tumores ſubſcirrhoſi glandularum colli, meſenteriive, cum labiis naſoque craſſioribus; ſcrophula ordinario mollior eſt ſchirro.

122 G. XXIII. CARCINOMA.

Ulcera cancroſa, ſordida, labiis duris everſis, ſcirrhoſis, ex quibus ichor manat acris et rodens; adſunt inſuper dolores lancinan-

tes, excreſcentiae fungoſae, venae adjacentes varicoſae non inepte pedes cancri referentes, et febris hectica.

G. XXIV. LEONTIASIS. 123

Cognoſcitur ex mutatione formae humanae in ferinam aliquatenus; unde aſpectus hominis ferinus.

G. XXV. MALIS. 124

Morbus eſt, qui cognoſcitur tumoribus, ulceribus, quae inſecta vermiformia vel horum larvae excitarunt, in quibus nidulantur, et ex apertis prodeunt.

G. XXVI. FRAMBÆSIA. 125

Morbus contagioſus, aliquando et congenitus apud Americanos, cujus praecipuum ſymptoma ſunt excreſcentiae fungoſae mori fructus referentes, quibus ſeſe adjungunt ulcera dyſepulota, exoſtoſes, caries, anchyloſes, et macies.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi contagioſi, chronici, qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes,

cruſtas, inducunt, plures foventur a viru inoculabili.

126 G. XXVII. SYPHILIS.

Ulcuſcula, porri, ficus, bubones, tophi, nodi, poſt vel cum gonorrhoea plerumque ; dein puſtulae cruſtoſae, dolores nocturni, oſtocopi, exoſtoſes, caries, macies, et color luridus, morbum adeſſe loquuntur.

127 G. XXVIII. SCORBUTUS.

Cognoſcitur ex maculis lividis, flavis, coeruleis tibiarum, ſtomacace, facie lurida, urina pellicula tecta.

128 G. XXIX. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis, tubera calloſa, ozaena, raucedo, cutis elephantina craſſa et unctuoſa, rictus ſatyrorum, anaeſtheſia in artubus, conſtituunt characterem hujus generis.

129 G. XXX. LEPRA.

Cognoſcitur ex puſtulis verrucoſis, duris, craſſis, herpetoſis, vel ſquamis ſiccis in corymbos diſpoſitis, prurientibus, eſcharoticis, rhagadibus ; dum plures ſunt ſiccae puſtulae, *ſicca ;* ubi vero, e contra,

plures humidae et exulceratae, *humida* dicitur lepra.

G. XXXI. SCABIES. 130

Cognoſcitur ex puſtulis, vel phlyćthaenis, lentis vel ſecalis grani magnitudine, lympham aut ſaniem continentibus, quae ſcalpendo ruptae cruſtas prurientes formant; contagioſus hic morbus et inoculabilis flexuras artuum maxime occupat.

G. XXXII. TINEA. 131

Incipit a puſtulis vel phlyćthaenis capitis aut faciei diverſi-coloribus, quae ruptae in cruſtas humidas vel ſiccas abeunt corymboſae; videtur nimirum eſſe ſcabies capitis, et nihil aliud.

O. VI. ICTERITIÆ.

Cognoſcuntur ex totius cutis colore inaſſueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido ſine pyrexia notabili.

G. XXXIII. AURIGO. 132

Flavedo cutis ad aureum, vel aurantium ten-

dens colorem, praecipue vero ſcleroticae membranae.

133 G. XXXIV. MELASICTERUS.

Color cutis et ſcleroticae niger, atro-lividus, fuliginoſus, conſtituunt characterem hujus generis, cum moeſtitia et perturbatione mentis.

134 G. XXXV. PHŒNIGMUS.

Morbis hicce apyretus rubedine cutis diffuſa maculata, vel punctata, notatur.

135 G. XXXVI. CHLOROSIS.

Pallor faciei totiuſve corporis, cum aſthenia, et ſaepius pica, ſine aurigine ſcleroticae; color eſt albus, cinereus, fuſcus, cereus, luridus, aut vireſcens, cum ſclerotica ſemper albiſſima perſeverante.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Noſcuntur ex ſignis claſſeos et affinitate cum prioribus generibus.

G. XXXVII. PHTHIRIASIS. 136

Exortus inſectorum, pediculorum, aut his affinium, cum porrigine, exulceratione, pruritu, cachexia.

G. XXXVIII. TRICHOMA. 137

Morbus contagioſus Hebraeorum, cujus praecipuum ſymptoma eſt capillorum conſpurcatio, complicatio, conglutinatio, et in cirros ac funiculos concretio inextricabilis, ſaepius cum phthiriaſi; haereditarius eſt morbus hicce.

G. XXXIX. ALOPECIA. 138

Defluvium pilorem et deſquamatio cuticulae conſtituunt characterem hujus morbi, cunctis animantibus communis.

G. XL. ELCOSIS. 139

Copioſa ampla ulcera, foetida, carioſa, chronica, cum pyrexia lenta, produnt hoc genus.

G. XLI. GANGRÆNA. 140

Anaeſtheſia, immobilitas, frigus, phlycthaenae lympham continentes, flacciditas, lividitas, et partis mors in cute et mem-

brana celluloſa, vel in omnibus ad oſſa uſque, textus facilisl aceratio et diſſolutio putrida, cum foetore cadaveroſo, definiunt hoc genus.

141 G. XLII. NECROSIS.

Eſt partis mors lenta ſine praevio tumore, mollitie, et diſſolutione foetida, cum dolore ardente ordinario et ſtupore, quae ſequitur exſiccatio partis, induratio, nigredo, et mumia; differt a gangraena in eo, quod lentius procedat, cum dolore rodente et ſtupore, et in mumiam abeat; gangraena contra molleſcat, phlycthaenas elevet, putreſcat, foeteat, atque cito decurrat.

CLASSIS IV.

Ingrata et moleſta ſenſatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, roſione, uſtione, preſſione, diſtractione, oritur, reliqua ſymptomata ſuperans hanc definit claſſem.

O. I. DOLORES VAGI.

Saepius univerſales, aut cutanei ad phlegmaſias non referendi.

G. I. ARTHRITIS. 142

Articulorum dolor ſpontaneus, periodicus a ſynovia corrupta.

G. II. OSTOCOPUS. 143

Eſt dolor conſtans et notabilis oſſium, a perioſtio interno potiſſimum affecto, ex preſſione non exacerbans, fixus.

G. III. RHEUMATISMUS. 144

Dolor diuturnus in parte carnoſa, tendinoſa artuum, vagabundus, ſaepius ſine coryza, rheumate, catarrho, eryſipelate, et ſine febre notabili; acutus rheumatiſmus facit genus inter phlegmaſias *Myoſitin* a me dictum; ſanguis miſſus rheumatiſmo la-

borantium eſt gelatinoſa cruſta tectus, et urina ſaepe ad ſulphureum colorem accedit.

145 G. IV. CATARRHUS.

Colli collove vicinarum partium dolor a frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, levi partium intumeſcentia, et pyrexia veſpertina exigua, ſeu amphimerina catarrhali.

146 G. V. ANXIETAS.

Moleſtia ad loci mutationem aſſiduam cogens aegrum, quem habet.

147 G. VI. LASSITUDO.

Eſt ingrata ſenſatio, juncta cum debilitate, quae ad quietem cogit virium reparandarum gratia.

148 G. VII. STUPOR.

Eſt moleſta ſenſatio cum obſcuritate tactus.

149 G. VIII. PRURITUS.

Moleſta ſenſatio ad ſcalpendum cogens.

150 G. IX. ALGOR.

Moleſtia qualis a ſummo aëris frigore excitatur, jam cum phricaſmo, rigore, vel concuſſione corporis, jam ſine his ſymptomatibus.

G. X. ARDOR. 151

Moleſtia qualis a ſummo aëris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS,

Faciei, vel Capillitii.

G. XI. CEPHALALGIA. 152

Eſt capitis gravitas vel ſenſatio moleſta, quae refert caput interius diſtenſum, turgidum, et quaſi gravatum, malum haud chronicum.

G. XII. CEPHALÆA. 153

Eſt dolor capitis chronicus, et, juxta Stahlianos, tenſivus; videtur ſola diuturnitate a cephalalgia differre receptiſſimum hoc genus.

G. XIII. HEMICRANIA. 154

Eſt morbus, cujus praecipuum ſymptoma eſt dolor in alterutro capitis latere, potiſſimum ad tempora, frontem, ac oculos, iſque vehemens ſaepe et periodicus quandoque.

155 G. XIV. OPHTHALMIA.

Cognoſcitur ex oculi dolore, rubore, intolerantia lucis, et lacrymatione, vel ſiccitate.

156 G. XV. OTALGIA.

Dolor in aure.

157 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium maxillarumque, cum vigiliis et ſaepius ptyaliſmo, maxillae aut genarum tumore.

O. III. DOLORES PECTORIS

Anhelationis expertes.

158 G. XVII. PYROSIS.

Ardor oeſophagi ad ventriculum uſque extenſus, ſine febre, vulgo Soda dicitur.

159 G. XVIII. CARDIOGMUS.

Eſt gravis pertinaxque moleſtia in praecordiis, cum ſenſu ponderis auctaeve molis et pulſatione, quae ad minimum motum augentur: Aneuryſmati cordis, auricularum, ſinuum, et arteriarum tribuitur cardiogmus, ſeu dolor cordis.

O. IV. DOLORES ABDOMINIS

Interni.

G. XIX. CARDIALGIA. 160

Moleſtia ad epigaſtrium et ventriculum relata, ſyncopen minitans.

G. XX. GASTRODYNIA. 161

Notabilis et durans in regione ventriculi dolor, ſine ſyncope et pyrexia.

G. XXI. COLICA. 162

Eſt dolor potiſſimum inteſtini craſſi regiones occupans in abdomine, hujuſque officia turbans, ſine febre notabili, cum pulſu plerumque ſuppreſſo, rariore, et obſtipatione.

G. XXII. HEPATALGIA. 163

Moleſta ſenſatio gravativa, tenſiva, aut quaevis alia in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

G. XXIII. SPLENALGIA. 164

Eſt dolor pertinax gravativus, tenſivus, in regione lienis, cum aliquali dyſpnoea,

puſu in inſpiratione intermittente, tumore et duritie, ſine pyrexia.

165 G. XXIV. NEPHRALGIA.

Dolor ſixus in regione renum et ureterum, ſine pyrexia acuta.

166 G. XXV. HYSTERALGIA.

Dolor in regione uteri, ſine parturitionis niſu et phlegmaſia notabili.

O. V. DOLORES EXTERNARUM

Partium locales.

167 G. XXVI. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

168 G. XXVII. RACHIALGIA.

Atroces dolores abdominis, ad lumbos et dorſum ſerpentes, preſſione non creſcentes, cum umbilici ſubin retractione, alvi conſtipatione, convulſione, manuum torpore, pareſi, paralyſi, ac contracturis artuum, definiunt hunc morbum.

G. XXVIII. LUMBAGO. 169

Eſt dolor lumborum corporis erectionem impediens, ſine nauſea, ureterum dolore, femoris ſtupore, urinaeve vitiis; dolor eſt in muſculis ſpinae dorſi aut ligamentis.

G. XXIX. ISCHIAS. 170

Dolor conſtans coxendicis, pelvis, et capitis femoris, nec non muſculorum ejuſdem; hinc difficultas gradiendi, ſtandi, claudicatio, frigus partis; conatus ad deponendam alvum dolorem augent iſchiadicum.

G. XXX. PROCTALGIA. 171

Eſt dolor podicis.

G. XXXI. PUDENDAGRA. 172

Dolor partium genitalium tum in viris tum in foeminis.

G. XXXII. DIGITIUM. 173

Eſt dolor periodicus articuli cujuſdem digiti, cum emaciatione et oſſis friabilitate, ſine omni phlegmaſia. Vide III. De Sauvageſ. T. I. p. 150.

CLASSIS V.

FLUXUS.

Char. Classis. Exitus inſolitus cujuſvis fluidi vel ſolidi e corpore.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis, vel ſaltem ſanguinolentae materiae ejectio ſeu effluxus, quacunque via, praeter alvinam.

174 G. I. HÆMORRHAGIA.

Eſt fluxus ſanguinis e naribus.

175 G. II. HÆMOPTYSIS.

Eſt ſanguinis expectoratio ſeu anacatharſis, cum tuſſi ſine notabili pyrexia.

176 G. III. STOMACACE.

Stomacace laborantibus ſanguis diſſolutus promanat e gingivis laxis, ſordidis, et foetidis, ſponte, vel ad levem harum attactum.

177 G. IV. HÆMATEMESIS.

Eſt ſanguinis rejectio ex oeſophago, cum vomitorio conatu, anxietate magna, et animi deliquiis; obſervantur et faeces alvi ſanguine tinctae, nigricantes.

G. V. HÆMATURIA. 178

Eſt effluxus ſeu minctio cruoris, urinae cruentae ex veſica, vel ſeminis ſanguinolenti ex urethra, in viris et mulieribus.

G. VI. METRORRHAGIA. 179

Sanguinis ex utero aut vagina fluxus morboſus, nimius.

G. VII. ABORTUS. 180

Eſt foetus immaturi, id eſt, ante nonum menſem graviditatis ſaltem aliquot ſeptimanis excluſio, ſubin cum metrorrhagia: Symptomata ſunt, laſſitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hyſteralgia, lipothymia, &c.

O. II. ALVIFLUXUS

Sanguinolenti.

G. VIII. HEPATIRRHŒA. 181

Eſt alvi fluxus per inferiora ſanguinolentus, nec ater, nec torminoſus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 182

Eſt ſanguifluxus ex tuberculis, mariſcis rubris, duris, dolorificis, ſinem inteſtini recti

obſidentibus, vel in recto latentibus; ſentiunt poſteriora tubercula aegri in recto ſaepius obſtipati, et digitus immiſſus inteſtino haec offendit; ſanguis in depoſitione alvi praecedit, vel ad minus comitatur, excrementa.

183 G. X. DYSENTERIA.

Eſt frequens torminoſa mucoſo-cruenta alvi dejectio.

184 G. XI. MELÆNA.

Eſt fluxus materiei nigricantis, atro-rubrae, ano vel cato frequens.

O. III. ALVIFLUXUS

Non ſanguinolenti.

185 G. XII. NAUSEA.

Eſt inanis vomendi conatus, et tamen maximis licet niſibus nihil niſi flatus aut mucus exiguus exantlatur; adeſt anorexia, gaſtrodynia, motus oſſis hyoidis ad ſuperiora, ptyaliſmus; capitis ad anteriora inclinatio, tremor labii inferioris, &c.

G. XIII. VOMITUS. 186

Eſt palpabilium materierum non cruentarum per os oeſophagumque rejectio frequens ex ventriculo; cauſa eſt antiperiſtaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis et muſculorum abdominalium preſſione, cum ſimultanea expiratione; pulſus eſt contractus, rigidus, et frequens.

G. XIV. ILEUS. 187

Gaſtrodynia, obſtipatio, anxietas, et vomitus demum faeculentae materiae, determinant hunc morbum; atrocia circa umbilicum tormina, ructus, nauſea, ſingultus, inteſtinorum volutatio, virium proſtratio, pertinax alvi obſtipatio, et vomitus demum faeculentus, ſunt ſymptomata principalia hujus morbi.

G. XV. CHOLERA. 188

Eſt ſyndrome ex vomitu, diarrhoea, gaſtrodynia, proſtratione virium, et ſubin ſurarum crampo.

G. XVI. DIARRHŒA. 189

Eſt recrementorum et excrementorum ut

plurimum fluxilium frequens per anum dejectio notabilis et conſtans, adeoque morboſa.

190 G. XVII. COELIACA.

Eſt albeſcentium, aut chyliacearum materierum per alvum frequens dejectio, plerumque profuſa, cum torminibus et proſtratione virium.

191 G. XVIII. LIENTERIA.

Alimenta parum aut nihil mutata per alvum dejiciunt, et quidem plerumque paulo poſt ingeſtionem, lienterici.

192 G. XIX. TENESMUS.

Muci frequens et pauca dejectio per anum, cum intenſa dejiciendi cupiditate, conatuque eidem proportionali; ſtimulum et dolorem ſentiunt aegri in inteſtino recto.

193 G. XX. PROCTORRHŒA.

Eſt fluxus mucoſi ſubalbi, flaveſcentis, quandoque ſtriis ſanguineis tincti, humoris ex vaſis haemorrhoidalibus externis, vel in recto latitantibus, qui humor ordinario ſpiſſior eſt, dum ex internis vaſis ſtillat, ſcybalaque praecedit: Vide Lieutaud, T.

1. p. 396. No. 4. Pruritum praeterea et ardorem hoc fluore madentes et foetentes in podice ſentiunt, queruntur. Species non adeo magni momenti in praxi poſſunt eſſe proctorrhoea externa, interna, periodica, ſanguinolenta, hujus generis, quod etiam proctolucorrhoea vocari poteſt, ob ſimilitudinem cum leucorrhoea.

O. IV. SERIFLUXUS.

Fluidi nec ſanguinolenti, nec per alvum, effluxus morboſi.

G. XXI. EPHIDROSIS. 194

Eſt ſudoris quantitate, qualitate, aut intempeſtivitate peccantis, excedentis effluxus.

G. XXII. EPIPHORA. 195

Eſt oculis conſtans effluxus humoris ſeroſi, lacrymalis, ſebacei, aut purulenti, morboſus.

G. XXIII. CORYZA. 196

Eſt humoris ſeroſi mucoſive e naribus fluxus morboſus, ſine, vel cum ozaena, concomitante plerumque gravedine capitis.

197 G. XXIV. PTYALISMUS.

Eſt ſalivae mucive, ſine anacatharſi ac vomitione, ex ore effluxus, emiſſio, aut ſputatio uber et conſtans.

198 G. XXV. ANACATHARSIS.

Eſt muci, lymphae, aut puris facta cum tuſſi e pectore per os rejectio frequens, notabilis, et morboſa.

199 G. XXVI. DIABETES.

Subita potus omnis per urinae vias emiſſio, vel urinarum utcunque coctarum nimia profuſio, cum ſiti, anorexia, et polydipſia.

200 G. XXVII. ENURESIS.

Involuntaria et inopportuna doloris et ardoris expers minctio, quaeque ſaepius inſciis accidit.

201 G. XXVIII. PYURIA.

Eſt purulentae, albae, flavae, mucoſae, aut lutulentae materiae cum urinis minctio.

202 G. XXIX. LEUCORRHŒA.

Eſt ſeroſae, flavae, puriformis, mucoſae, foetidae, atrae, &c. materiae ex utero aut vagina delapſus, effluxuſve morboſus.

G. XXX. LOCHIORRHŒA. 203

Eſt lochiorum alborum nimius fluxus puerperam debilitans.

G. XXXI. GONORRHŒA. 204

Eſt ſtillicidium fluidi ſeminalis, vel puriformis, ex urethra, ſine minctione.

G. XXXII. GALACTIRRHŒA. 205

Eſt ſtillicidium lactis e mammis, vel locis inſolitis.

G. XXXIII. OTORRHŒA. 206

Eſt fluxus ſeroſus, purulentus, foetidus, ex cavo auris, meatu auditorio, vel ambitu auriculae.

O. V. AERIFLUXUS.

Sunt flatus halituſve inſolitae et vitioſae emiſſiones per os vel anum, &c.

G. XXXIV. FLATULENTIA. 207

Eſt morbus flatuum per os, vel anum, frequenti emiſſione et borborygmis deſignatus.

208 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Eſt flatuum ex veſica per urethram, vel ex utero per vaginam, emiſſio.

209 G. XXXVI. DYSODIA.

Eſt foetidorum vaporum e corpore exhalatio odoratum offendens, exhalant tales vapores e naribus, ore, vulva, inguinibus, axillis, et pedibus.

CLASSIS VI.

Char. Classis. Meatuum impeditio; hinc ſolitarum in ſanitate excretionum impedimentum et emanſio; *Suppreſſorios* morbos vocavit Ill. Linnaeus.

ORDO I. SUPPRESSIONES

Humorum ſeroſorum.

G. I. ADIAPNEUSTIA. 210

Tranſpirationis naturalis, et liquoris cutis organa humectantis, ſuppreſſio.

G. II. STERILITAS. 211

Eſt geniturae ſuppreſſio, conceptus impeditio.

G. III. ISCHURIA. 212

Urinae ſecretae a renibus retentio ſeu ſuppreſſio, cum tumore hypogaſtrii, vel ſecretiones in renibus ſuppreſſio, cum ſtupore renum, ſingultu, anorexia, vomitu, ptyaliſmo urinoſo, ephridroſi.

G. IV. DYSURIA. 213

Difficilis et dolorifica, guttata ſaepius et ardens mictio; eſt ergo fluxus urinae pro

parte ſuppreſſus, et non in integrum, ut in iſchuria.

214 G. V. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

215 G. VI. DYSLOCHIA.

Eſt lochiorum ſuppreſſio.

O. II. SUPPRESSIONES INGERENDORUM,

Conſtrictio meatuum ingerenda admittentium, ſine phlegmaſia.

216 G. VII. DYSPHAGIA.

Eſt deglutitionis ſuppreſſio, impeditio, abſque notabili reſpirationis laeſione et phlegmaſia.

217 G. VIII. ANGINA.

Eſt reſpiratio impedita, cum ſenſu obicis in gutture, abſque phlegmaſia, ſive dein adſit dyſphagia, ſive non.

O. III. SUPPRESSIONES

Imi ventris.

G. IX. DYSMENORRHŒA. 218

Menſtrua ſuppreſſa, dolorifica, cum lumbagine, cephalalgia, dyſpnoea, palpitatione cordis, &c. conſtituunt characterem hujus generis; fluxus menſtruus periodicus a tribus ad 8 dies protelari ſolet; quantitas ſanguinis a quinque ad 10 uncias limitatur; circa 13 annum aetatis incipit, et ad 45 plerumque producitur; ſanguis refert ſanguinem victimae.

G. X. DYSTOCIA. 219

Dolorifica, laborioſa ultra modum foetus excluſio aut ſecundinarum, vel penitus impoſſibilis.

G. XI. DYSHÆMORRHOIS. 220

Eſt ſuppreſſio ſuetarum haemorrhoidum; dum fluxus haemorrhoidum ſuetarum periodicus ſaepius ſupprimatur, ex quacun-

que occaſione, ante annum circiter 60, 65, quo hic fons ſponte ſiccari ſolet; oriuntur lumbago, iſchias, vertigo, cephalalgia, tenſio cervicis, anxietas, dyſpnoea, colica, &c. Haemorrhoidum fluxus, qui ultra 65. annum aetatis protelatur, jam morboſus haberi debet et ſupprimi minuive; ſenectus enim hunc fluxum non fert. Haemorrhois rariſſime cum conſtantia ſanitatis obſervatur; hinc vix pro beneficio haberi poteſt, licet morbos graviores praevertere dicatur.

231 G. XII. OBSTIPATIO.

Faecum alvi exoneratio impedita. *Carolus Linnaeus*; eſt nimirum ſegnis, difficilis, rara faecum alvi excretio, vel plane nulla etiam medicamentis prolici poſſunt excrementa: Medici aſſiduo curant obſtipationem, et tamen hanc nec in numero morborum tolerant; ecquidem raro eſt morbus per ſe, ſaepiſſime vero ſymptoma hoc alios morbos comitatur et auget.

CLASSIS VII.
SPASMI.

CHAR: CLASSIS. Contractio conſtans, vel interpolata, muſculorum motum localem efficientium, eaque invita.

O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

Rigiditas organi, vel artus determinati.

G. I. STRABISMUS. 222

Oculi alterutrius ſpaſmus, tonicus axium opticorum divergentiam, vel convergentiam nimiam inferens, ſeu eſt ſpaſmus tonicus oculi, unde hujus axis cum alterius axi ad unum objectum non convergit.

G. II. TRISMUS. 223

Eſt ſpaſtica contractio tonica, aliquando viſa fuit ſolum clonica maxillae inferioris, vulgo *trotura oris* dicitur; ruſticus venerat ad me pedes triſmo tonico laborans pro conſilio, contra hunc morbum; da-

tur igitur ſolitarius hicce morbus; vide *tetanum*.

224 G. III. OBSTIPITAS.

Eſt colli ſpaſmus, vulgo dicitur *torticollis*, tonicus, vel clonicus capitis mobilitatem et directionem mutans.

225 G. IV. CONTRACTURA.

Eſt artus unius vel plurium conſtans, diuturna rigiditas, inflexilitas.

226 G. V. CRAMPUS.

Eſt ſubitanea, fugax, et dolorifica muſculi rigiditas, cum dolore ſubin atroci.

227 G. VI. PRIAPISMUS.

Eſt penis ingrata et ſine appetitu libidinis rigiditas, ſeu erectio.

O. II. SPASMI TONICI GENERALES.

228 G. VII. TETANUS.

Spaſmus generalis tonicus ſubito ortus, cum dyſpnoea; rigent muſculi omnes, et corpus inflexile ſervant, cum dyſpnoea et

rubore faciei ; vel rigent muſculi ſoli poſteriores corporis, aut anteriores, et corpus flectunt horribiliter, et plerumque flexum ſervant diutius.

G. VIII. CATOCHUS. 229

Spaſmus generalis tonicus ſenſim factus, ſine dyſpnoea, agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus.

O. III. SPASMI CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujuſdem organi aut artus, cujus motivum ab aegro non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS. 230

Spaſmus clonicus oculi, vel palpebrae.

G. X. CARPHOLOGIA. 231

Eſt ſpaſmus clonicus manuum, quo aegri floccos e tegumentis evellunt, paleas colligunt, muſcas venantur ; ſymptoma hoc a ſuffuſione natum plerumque eſt lethale,

232 G. XI. SUBSULTUS.

Eſt motus palpitans aut tremulus tendinum, pone carpos potiſſimum obſervabilis.

233 G. XII. PANDICULATIO.

Eſt ſpaſmus artus ſucceſſive extendens plures, vel omnes in oſcitatione.

234 G. XIII. APOMYTTOSIS.

Eſt ſuccuſſio cutis et capitis, cum trunci totius agitatione tremula et violenta ; adeſt ſimul exſpiratio ſonora, quaſi ſtertoroſa.

235 G. XIV. CONVULSIO.

Eſt agitatio invita artus, vel muſculi brevis cum ſuperſtite exercitio animi.

236 G. XV. TREMOR.

Artuum aut capitis alterna, per itus et reditus frequentes, motitatio per breviſſima ſpatiola, cum movendi voluntate concurrens, qua ceſſante, ceſſat quoque tremor.

237 G. XVI. PALPITATIO.

Eſt pulſatio in regione cordis inſolita, cum pulſu intermittente, crapizante, tremulo, ſubduro, inaequali, inordinato, debili, quandoque et dyſpnoea ad quemlibet mo-

tum notabili; habeo aegram, cujus pulſus ſub actuali palpitatione remittit, vel intermittit, in 5 annum jam hoc ex morbo languentem; ſubin tremorem in praecordiis patitur, cum pulſu caprizante tremulo; notum eſt, quod regularis pulſatio cordis non dicatur palpitatio.

G. XVII. CLAUDICATIO. 238

Eſt vitioſus gradiendi modus, quo truncus ſingulis paſſibus huc vel illuc nimium inclinat, unde crus indecore movetur, trahitur.

O. IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

G. XVIII. PHRICASMUS. 239

Eſt ſuccuſſio invita totius cutis, imo ſaepius totius corporis, frigorifera.

G. XIX. ECLAMPSIA. 240

Eſt morbus convulſivus clonicus acutus, quandoque remittens, cum ſenſuum feriatione in paroxyſmo; pollices intro non

premunt, ſpuma ex ore non eructat, ſpaſmi ſunt tremuli artuum omnium; vulgo vocatur hic morbus *apoplexia puerilis.*

241 G. XX. EPILEPSIA.

Eſt morbus ſpaſmodicus clonicus, intermittens, ſeu periodicus, chronicus, cum variorum membrorum invita agitatione, dyſpnoea, ſpumae oris eruptione, pugnorum conſtrictione, et ſenſuum feriatione externorum et internorum, ſine aſphyxia. *Symptomata:* Subitaneus caſus, oblivio omnium, clamor, mugitus, ſtridor dentium, truculentia oculorum, ſpuma oris, pugnorum conſtrictio, totius corporis agitatio.

242 G. XXI. HYSTERIA.

Eſt artuum organorumque externorum internorumque ſpaſmus clonicus tonicuſve, paroxyſmis fugacibus, leviter variantibus, cum puſillanimitate, ſenſibilitate animae ſumma, mortis formidine intenſa, teneritudine partium convulſarum remanente, attactum fugiente, et urine hyalina. Signa pathognomica hujus morbi ſtatuit Ill. Aſtruc agitationem matricis, pnycem, con-

ſtrictionem pectoris et glomum fluctuantem in abdomine.

G. XXII. SCELOTYRBE. 243

Eſt motus ſemivoluntarius unius lateris, vel totius corporis in greſſu, ſitu erecto, aut comeſtione, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem, referens; hunc morbum vocavit *Sydenhamus Choream Sancti Viti.*

G. XXIII. BERIBERIA. 244

Eſt motus gradientium genua ſpaſtice retrahens, cum tremore artuum, formicationis ſenſu, vocis raucedine, ſtupore dolorifico artuum, qui morbis Indis eſt familiaris. In ovibus olim lupum videntibus beriberiam ſpaſmum vidi, ſtantes hae vel gradientes triſtes momentanae retrahunt genua, ad ſitum naturalem illico reditura.

CLASSIS VIII.
ANHELATIONES.

Char. Classis. Eſt agitatio invita, defatigans muſculorum pectoris, cum reſpiratione difficili, laborioſa, ſonora, frequenti, ſine febre notabili, et ſine phlegmaſia.

O. I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.

Sunt ſymptomata fugacia ſpaſmodica, ſaepius repetentia, quae conſiſtunt in ex vel inſpirationibus ſonoris.

245 G. I. EPHIALTES.

Morbus hic recurrens afficit dormientes cum anhelatione et inſomnio corporis cujuſdam pectus opprimentis; unde reſpiratio horum querula, gemebunda, et anxia.

246 G. II. STERNUTATIO.

Eſt violenta, ſonora, et ſubitanea exſpiratio, in nares poſticas immiſſo aëre, ad nares everrendas ſub convulſiva capitis et trun-

ci corporis concuſſione, ad anteriora flexione. Species ſunt ſternutationis, *catarrhalis*, *rubeoloſa*, *verminoſa*. *ſpontanea*, *febricoſa*, *epidemica*, *critica*, *medicamentoſa*, &c.

G. III. OSCEDO. 247

Eſt aëris copioſi profunde inſpirati diutina, lenta, et invita naturalis exſpiratio, cum magno oris hiatu; ſaepe concurrit et pandiculatio.

G. IV. SINGULTUS. 248

Eſt concuſſio diaphragmatis invita, cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

G. V. TUSSIS. 249

Eſt concuſſio ſonora, violenta, invita pectoris, cum exſpiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

O. II. ANHELATIONES SUPPRESSIVÆ.

Hae ſunt cum metu ſuffocationis, ſuntque pleracque conſtantes.

250 G. VI. STERTOR.

Eſt reſpiratio ſonum gravem et tremulum in gutture edens, ſaepius ſibilo ſtipata.

251 G. VII. DYSPNŒA.

Eſt difficultas reſpirandi aſſidua et chronica, ſine ſignis empyematis, hydrothoracis.

252 G. VIII. ASTHMA.

Eſt chronica, periodica reſpirandi difficultas.

253 G. IX. ORTHOPNŒA.

Eſt morbus continuus acutus, ſubitanea anhelatione ſublimi, et fere ſuffocatoria, ſtipatus.

254 G. X. PLEURODYNE.

Anhelatio, cum pectoris dolore, ſine phlegmaſia, cum exigua vel nulla febre.

255 G. XI. RHEUMA.

Cognoſcitur ex difficultate reſpirandi, cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitatur coryza, ſternutatio, raucedo, cephalalgia, tuſſis, ſine pyrexia notabili, et ſine ſanguine inflammato; *endemius hic morbus.*

256 G. XII. HYDROTHORAX.

Eſt genus anhelationis chronicum continuum, ſtipatum phlegmaſia pedum, pallore

faciei, oedemate manuum, ſubita in ſomno ſuffocatione, alterutrius manus ſtupore, ſine ſignis empyematis; haec ſymptomata jam adſunt omnia, jam tantum aliqua; anhelatio creſcit pro inclinatione corporis.

G. XIII. EMPYEMA. 257

Eſt difficultas reſpirandi a pectoris reclinatione creſcens, quam praeceſſit phlegmaſia pectoralis non reſoluta, ſed ſuppurata; comitatur amphimerina tabida notabilis, macies, decubitus horizontalis et in latus ſanum difficilis, gravitas ſupra diaphragma, ſudores profuſi, rubor genarum, et multa ſymptomata hydrothoracis: Species ſunt, *peripneumonicum*, *vomicale*, *pleurale*, *mediaſtinale*, *diaphragmaticum*, *intercoſtale*; quas ſpecies ſufficiat hic nominaſſe, quum earundem hiſtoria necdum ſatis provecta ſit.

CLASSIS IX.
DEBILITATES.

Char. Classis. Eſt impotentia clare et diſtincte ſentiendi, appetendi, conſueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, ſenſibus internis et externis utendi.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare et diſtincte ſentiendi.

258 G. I. AMBLYOPIA.

Eſt viſus debilitas reſpectiva ad ſitum, gradum lucis, diſtantiam objecti, oculis pellucidis; vel eſt debilitas viſus abſoluta, vel reſpectiva, ſine opacitate corneae, aut vitio internarum partium oculi.

259 G. II. CALIGO.

Eſt imminutio partialis, vel totalis deletio viſus, propter repagulum opacum citra ſeu ante pupillam oculo inhaerens, aut palpebris.

G. III. CATARACTA. 260

Eſt viſus debilitas, vel abolitio, ob maculam opacam, poſt pupillam poſitam, ſeu opacitatem lentis cryſtallinae.

G. IV. AMAUROSIS. 261

Eſt viſus ſuppreſſio, abolitio, vel defectus, cum pupillae ferme plenaria immobilitate, ſine ſenſibili oculorum vitio aut opacitate externis.

G. V. ANOSMIA. 262

Eſt imminuta, vel ſuppreſſa facultas percipiendi odores.

G. VI. AGHEUSTIA. 263

Eſt ſuppreſſio facultatis, qua diverſos ſapores percipimus, cum vel ſine anorexia.

G. VII. DYSECŒA. 264

Eſt audiendi difficultas, ſeu gravis auditus et obſcura perceptio ſonorum.

G. VIII. PARACUSIS. 265

Eſt debilitas ſeu confuſio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, ſed non diſtincte diverſos ſonos et articulatas voces audiunt, vel alios ſonos clare et diſtincte audiunt, alios tantum clare ſine diſtinctione.

266 G. IX. COPHOSIS.

Eſt obſcura, vel nulla ſonorum perceptio, ſeu impotentia percipiendi ſonos totalis, vel partialis.

267 G. X. ANÆSTHESIA.

Eſt ſenſus omnis privatio, ſuperſtitibus motu muſculari et rerum neceſſariarum appetitu aliquantum minutis, ſine omni ſopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum ſenſitivorum debilitas, ſeu imminutio notabilis.

268 G. XI. ANOREXIA.

Eſt notabilis debilitas, imminutio, ſeu ceſſatio famis in jejunis animantibus.

269 G. XII. ADIPSIA.

Eſt ſitis debilitas, ſeu imminutio, aut abolitio.

270 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Eſt debilitas, vel abolitio appetitus venerei, ſeu impotentia : Vide *ſterilitatem.*

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia exercendi motus ſolitos voluntati ſubjectos.

G. XIV. MUTITAS. 271

Eſt impotentia proferendi voces articulatas.

G. XV. APHONIA. 272

Eſt plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem, ſyncopen, et comata; muti inarticulatam vocem habent, aphoni contra nullam.

G. XVI. PSELLISMUS. 273

Eſt difficultas ſeu impotentia quaſdam ſyllabas literaſve recte pronunciandi, faciunt hoc puellae quaedam naviter, ut magis placeant procis.

G. XVII. CACOPHONIA. 274

Eſt vocis vitium et inſuavitas atque aſperitas.

G. XVIII. PARALYSIS. 275

Eſt unius tantum artus, vel articuli frigida plerumque laxa immobilitas, abſque dolore cum vel ſine anaeſtheſia; *pareſis* eſt ſenſim invadens debilitas movendi artus, ſeu eſt imperfecta paralyſis; movent enim hi artus, ſed difficulter; colicam pictonum aliaſque rachialgiae ſpecies comitatur, vel ſequitur pareſis, lente accedit paretica debilitas, et non eſt tanta,

quanta obſervatur paralyticorum ; actu obſervo pareſin in brachiis egregii chirurgi Chriſtophori Nohrer, ex colica pictonum laborantis.

276 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Cognoſcitur ex ſumma debilitate, vel integra motus muſcularis ſuppreſſione unius lateris corporis, cum laxitate, frigiditate, indolentia artuum et mentis integritate, ſine vel cum anaeſtheſia.

277 G. XX. PARAPLEXIA.

Eſt paralyſis artuum inferiorum, vel omnium artuum, cum enureſi, anaphrodiſia, quandoque et anaſtheſia ac maraſmo.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Virium vitalium, pulſus, et reſpirationis debilitas ſeu imminutio ; *pulſus eſt perpendiculum vitae.*

278 G. XXI. ASTHENIA.

Eſt debilitas omnium artuum, ſuperſtite actionum vitalium minutarum tenore, ſuperſtitibuſque ſenſibus, ſine dolore.

G. XXII. LIPOTHYMIA. 279

Eſt ſubitanea et brevis virium muſcularium et ſenſuum dejectio, ſeu eclipſatio, ſuperſtite pulſu et cognoſcendi aliqua facultate adſtantes, cum aurium tinnitu, calore, vertiginoſaque capitis turba.

G. XXIII. SYNCOPE. 280

Eſt ſubitanea virium omnium animalium, et vitalium ſenſuumve, imminutio tanta, ut aeger per tempus ſui conſcius non ſit, cum lenta lenive reſpiratione, pulſu obſcuro, ſudore frigido, et aliquali interiorum calore.

G. XXIV. ASPHYXIA. 281

Eſt ſubitanea eclipſis omnium actionum naturalium, animalium, et vitalium, cum mortis, imagine: Vide Cl. *Lanſicium* circa mortes ſubitaneas.

O. V. COMATA SEU MORBI SOPOROSI.

Omnium ſenſuum feriationes, maximae debilitates.

282 G. XXV. CATALEPSIS.

Eſt ſenſuum omnium motuumque muſcularium ſuppreſſio, pulſu et reſpiratione pacatis, placidis, lentis, minutis, vel obſcuris, cum mira ad quoſvis ſitus ſuſcipiendos et retinendos artuum flexilitate, aptitudine; retinent figuram, in qua ipſos prehendit morbus, et omnem recipiunt ſervantque, quam illis dederis; morbus eſt recurrens, et fors tantum mulierum.

283 G. XXVI. ECSTASIS.

Eſt ſtatus ſoporoſus a gravi pathemate, vel mentis attentione profunda ortus, aegrum in eodem ſitu, quo prehenſus eſt, retinens, ſine aptitudine cataleptica.

284 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Eſt ſopor apparens, cum pervigilio delirioſo reali, muſſitatione; vel eſt ſopor levis e quo aegri facile excitantur, cum delirio comitante.

285 G. XXVIII. LETHARGUS.

Eſt ſtatus ſoporoſus facile excitabilis, cum ſummo imaginationis et memoriae torpore, oblivione, et febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 286

Eſt ſomnolentia facile excitabilis, ſine febre, oblivione, ſtertore, delirio.

G. XXX. CARUS. 287

Eſt ſomnus altiſſimus, vix aut ne vix excitabilis, ſine ſtertore, cum reſpiratione tacita pacatiſſima; morbus ſaepius eſt acutus; ſemi-apertis oculis plerumque dormiunt omnino immobiles.

G. XXXI. APOPLEXIA. 288

Eſt ſomnus profundiſſimus, vix aut ne vix excitabilis, cum ſtertoroſa reſpiratione, faciei tumore, omnium artuum laxitate, et pulſu plerumque duro, forti.

CLASSIS X.
EXANTHEMATA.

Char. Classis. Febris cum aſthenia, efflo-reſcentia cutis maculata varia, puſtuloſa, papuloſa, phlyctenoidea, &c. vel cavi oris, ſaepius maligna.

ORDO I. EXANTHEMATA CONTAGIOSA.

289 G. I. PESTIS.

Eruptio purpurae, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia typhode, maligna, dat characterem peſtis: Vide celebrem Loimographum *Diemerbroeckium.*

290 G. II. VARIOLA.

Praeludium variolae pateſit cephalalgia, lumbagine, nauſea, vomituritione, eclampſia, et febre continua inflammatoria; erumpunt dein puſtulae phlegmonoideae ſuppurantes, eſcharoticae, deciduae, cicatriſantes; variola ſaepiſſime epidemicus

morbus habet IV ſtadia, nempe contagium, eruptionem, ſeu inflammationem puſtularum, ſuppurationem, tandem exſiccationem.

G. III. PEMPHIGUS. 291

Eſt phlegmaſia ſaepius acuta, exanthematica, ſtipata bullis ſeu veſiculis avellanam circiter magnitudine aequantibus, ſero flavo turgidis, per cutim ſparſis : An *Hippocratis* T. 1. p. 684. ichores conſtituerint pemphigum ? Tomo citato, p. 798. *Hippocrates* ſcripſit : ‘ πυρετοι οι δε πεμφιγωδεις.’ Et *Claudius Galenes*, ſexto epidemiorum T. 1. Claſſe 3. p. 311. Baſilea 1561, inter reliquas interpretationes hujus febris, etiam hanc admiſit, quae eſt character hujus generis ; nihil ergo novi pemphigus.

G. IV. PURPURA. 292

Sunt maculae pulicum morſibus ſimiles, faciei parcentes, preſſione non evaneſcentes, carentes ſtigmate aculei a pulice infixi, coloris purpurei, latcritii, nigri, lividi, ſine tumore, aſpredine, cum febre amphimerina, vel tritaeophya, putrida, aſthenia, lingua plerumque rubra, lateritia, molli.

293 G. V. RUBEOLA.

Poſt praeludium catarrhoſum, coryzam, epiphoram, tuſſim, cephalalgiam, ſomnolentiam, et palpebrarum tumorem, erumpunt papulae corymbóſae rubrae, pulicum morſus aemulantes, aſperae, uniformes, evaneſcenti-furfuraceae die IV, cum exiguo levamine ſymptomatum contagii in facie, collo, thorace, trunco reliquo, et artubus; quandoque ſexto die in facie jam aſperantur, ſiccantur, et in tenuiſſimum furfurem fatiſcit epidermis; et hoc eſt initium tertii ſtadii, quod ordinario 8. vel 9. die, una cum morbo, finitur; febris comitatur rubeolam continua; rubeolam porro inoculat atmoſphaera morbilloſa bronchiis, ſacco lacrymali, et ſinubus ſex in nares patentibus; medici contra ſeminatores rubeolae goſſypium furfure morbilloſo repletum ſublimi vulnuſculo, cujuſque brachii imponunt, emplaſtro omnia tegunt, et 6. die poſt appóſitum hunc apparatum incipiunt aegrotare.

G. VI. SCARLATINA. 294

Eſt efflorefcentia maculoſa, ruberrima, pruriens; papuloſa, irregularis, diffuſa, deſquambilis, ſine praeludio catarrhali efflorefcens, cum febre plerumque judicatoria. Stadia tria ſcarlatinae obſervamus, praeludium noſcimus inde, quod febris plerumque judicatoria, cum horrore et frigore, prehendat infantes, ſub finem aeſtatis, ſine praeludio catarrhali et ſine vomitu; quarto vel citius die, facies intumeſcit modice, pectus, &c. erumpunt exanthemata paulo ante deſcripta, et hoc eſt ſtadium ſecundum; poſt 3 vel 4 dies incipit ſtadium tertium, in quo evaneſcunt exanthemata, et epidermis ſub forma ſubtilis pollinis deſquamatur.

O. II. EXANTHEMATA NON CONTAGIOSA.

G. VII. MILIARIS. 295

Eruptio phlyćthaenarum milii ſemine rara majorum, cum ſudore vapido; febris

continua, vel remittens, putrida; praeludit oppreſſio praecordiorum, gaſtrodynia gravans, pulſus ſuppreſſus, urina minus tincta, lingua plerumque alba, mollis, aſthenia; perſtant in cute 4, 5, 6, 7, 9, 11, &c. diebus, et cum pruritu, ſudore, ſolvuntur, in farinam ſubtilem diſparent. *Hippocrates*, T. 1. p. 697. deſcribit miliarem et quidem criticam, ſeu ſervantem mulieres omnes, quarum cutim obſederat haec efflorеſcentia. *Silenus* inſuper indubie 8. die morbi miliari rubra maculatus fuit, T. 1. p. 674.

296 G. VIII. ERYSIPELAS.

Eſt eruptio erythematis cum febre continua, vel amphimerina potius dicenda, tumiduli, ſuperficialis, dilatabilis, deſquamabilis; ſiſtit nimirum maculas latas, amplas, ſubtumidulas, non ſuppurabiles; ſanguis miſſus cruſta inflammatoria non eſt tectus, ſed pelle alba, tenui, et ſat tenaci; dolor erythematis eſt calens, rodens. Tria ſtadia obſervantur eryſipelatis: *Primum* abſolvit gravedo, horror, inappetentia, laſſi-

tudo, cum febricula amphimerina; die 2. 3. vel 4. incipit ſecundum ſtadium, eruptio, nempe, erythematis, quod ordinario in 4. uſque diem augetur; in tertio ſtadio collabitur ſucceſſive tumor, calor, et dolor erythematis, et epidermis deſquamatur, quod opus plerumque 4 diebus Natura abſolvit.

G. IX. ESSERA. 297

Conſtituunt hoc genus maculae rubellae impruriginoſae, non faſtigiatae ultra libellam cutis, magnitudinis grani tritici, zeae, ſubito erumpentes ferme ſine febre, et poſt 4, 5, 7, 9, 11, 14, dies ſponte et ſine deſquamatione epidermidis diſparentes; quandoque ſunt paucae, ſubin contra numeroſae; aegri ſunt plerumque orthoſtadii; praecedit eruptionem nox inquieta, leves anxietates; cutis, exſtante eſſera, non eſt aſpera ad attactum, nec rubedo eſt diffuſa; maculae aliae ſunt majores, aliae minores, ſub epidermide latentes; hujus morbi meminit *D. Allen.* p. 407. ubi tamen non hunc, ſed alium deſcripſit; Cl. *D. Lieutaud*, T. 1. p. 614. unam ſpeciem deſcripſit hujus generis.

298 G. X. APHTHA.

Cognoſcitur aphtha papulis ſeu phlyctaenis linguae, faucium, oris ſuperficiem occupantibus, ſubrotundis, plerumque ſemilinearibus, colore albis in diſco, cum radio ſaepius rubro, vel rubris, brunneis, flavis, lividis, nigris, et febre tritaeophya, vel obſcura hectica, aut penitus nulla; adeſt ſimul ſomnolentia, dolor urens oris, et difficultas in maſticatione, ſuctione, ac deglutitione. Aphtha 4 ſtadia habet diſtincte, ſi non omnibus ſpeciebus, in febrili obſervabilia: Stadium *primum* ſeſe prodit laſſitudine ſpontanea, levi dyſpnoea, gaſtrodynia, anxietate exigua, ſomnis turbatis, et calore oris: Stadium *ſecundum* propullulatio papularum nobis adeſſe loquitur: In ſtadio *tertio* elevantur papulae ſeu maculae in phlyctaenas miliares, *quae probabiliter ſunt idem cum miliaribus cutis*: Stadium *quartum* abſolvit deſquamatio epidelii, cum dolore ſenſibiliſſimo linguae et faucium ſuperficiali.

CLASSIS XI. PHLEGMASIÆ.

Char. Classis. Febris quaſi ſemper continua, cum pulſu duro, dolore topico, alicujus partis inflammatione, ſanguine cruſta inflammatoria tecto, urina plus colorata, lingua ſubſicca, ſicca, calente, &c. *Hippocrates*, T. 1. p. 810. 811. reliquit: Lingua concolor attingentibus ipſam humoribus: Quapropter per hanc humores cognoſcimus.

O. I. PHLEGMASIÆ MUSCULOSÆ.

G. I. PHLEGMONE. 299

Cognoſcimus phlegmonem ex febre acuta continua inflammatoria, pulſu duro, ſanguine cruſta inflammatoria tecto, et partis externae inflammatione; pars externa phlegmone affecta calet, rubet, dolet, tumet, eſt ſimul tenſa reſplendens ſphaeroidea; cutis ipſa et partes ſub ipſa con-

tentae inflammatae ſunt; phlegmone in ſuppurationem tendit, neutiquam vero eryſipelas.

300 G. II. CYNANCHE.

Eſt phlegmaſia acuta pharyngis, laryngis, dyſpnoeam et dyſphagiam inducens, cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore, dolore, tumore, quae adeſſe docet inſpectio in fauces, depreſſa lingua.

301 G. III. MYOSITIS.

Febris acuta inflammatoria, dolores in diverſis muſculis artuum, eorundemque involucris, diu noctuque diſcruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes; ſanguis miſſus eſt tectus cruſta inflammatoria ſubgelatinoſa, vel pelle tenui tenaci; hic morbus vulgo audit rheumatiſmus acutus.

302 G. IV. CARDITIS.

Adeſt dolor conſtans ſub ſterno in regione cordis urens, flammam vitae extinguens, cum palpitatione, frequentibus animi deliquiis, pulſu jam magno, duro, per momenta, jam parvo, frequente, inaequali, inordinato, intermittente; febre acuta ty-

phode et anxietatibus ; cor manu tenentes aegri fugitivis oculis et mille jactationibus agitati, ſibi comburi, illudque mori quaeruntur, clamant.

O. II. PHLEGMASIÆ MEMBRANACEÆ.

G. V. PHRENITIS. 303

Eſt phlegmaſia acuta, cum pyrexia et delirio perpetuo, a cephalalgia atroci plerumque incipiens; delirium quandoque eſt audax, urina plerumque citrina, cum nebula ſublimi.

G. VI. DIAPHRAGMITIS. 304

Eſt phlegmaſia cum dolore obſcuro ad coſtas ſpurias, oppreſſione pectoris, ſputis ſaepe cruentis, orthopnoea, anxietate; ſingulum praecordia ſtringens quaeruntur aegri; angulos oris ſemivoluntarie ſaepe retrahentes delirant; quandoque lethargo, vel cataphora laborant; pulſus eſt inaequalis, inordinatus, intermittens, durus; hypochondria intro tracta, reſpiratio ſine motu

diaphragmatis; facies jam pallet, jam rubet; calor eſt urens ad praecordia internus; ſcripſi ſicut obſervavi in meis aegris: Vide *Hippocratem*, T. 2. p. 101. IX.

305 G. VII. PLEURITIS.

Eſt phlegmaſia cum pyrexia acuta, dyſpnoea, dolore pectoris plerumque punctorio, et tuſſi moleſta dolorem augente, ſine gravitate in medio pectore; ſedes morbi in 300 pleuriticis denatis a *P. Servio Romano* in pleura pulmonali inventa eſt; invenit, nimirum, pleuram pulmonis ſuperficiem inveſtientem, cum ſuperficialibus et extremis vaſis pulmonis, inflammatam.

306 G. VIII. GASTRITIS.

Eſt phlegmaſia ſtipata dolore epigaſtrii, ardore, tenſione, ſiti, nauſea, vomitione, ſingultu, et pyrexia acutiſſima.

307 G. IX. ENTERITIS.

Eſt phlegmaſia acuta, cujus ſymptomata ſunt tenſio tumida et valde dolorifica, tactum non tolerans, partium abdominis inteſtinis reſpondentium, cum pyrexia meteoriſmo, quandoque et ileo, vel dyſenteria.

G. X. EPIPLOITIS. 308

Bis obſervavi hanc phlegmaſiam, ſemel in viro ruſtico 30 annorum, et ſemel in quadragenaria muliere, cum ſequente charactere: Febris erat mitis amphimerina, virium non adeo magna proſtratio (ruſticus venerat ipſus 4ta die morbi pro conſilio ad me) lingua albà tumidula, ſanguis miſſus coriaceus, obſtipatio non pertinax, dolor obtuſus infra peritonaeum ad attactum paululum acutus, tumor omenti, reſpiratio ſuſpirioſa, pulſus durus naturali celeritate et frequentia non multum major, ſitis mediocris, urinae flavae, appetitus aliquis, aliquis et ſomnus.

G. XI. CYSTITIS. 309

Eſt phlegmaſia, cujus praecipua ſymptomata ſunt intumeſcentia ovalis in pelvi, cum tenſione, dolore tactum non tolerante, dyſuria, vel iſchuria et pyrexia amphimerina; adſunt inſuper vigiliae, ſitis, ſubin delirium, extremorum frigus, teneſmus, vel obſtipatio; pulſum obſervavi tenſum, ſubdurum, naturali frequentia et celeritate non multum majorem; in ſanguine

miſſo cruſtam tenuem albam, ſubgelatinoſam, clyſmatum difficilem injectionem: Scribo ſicut obſervavi.

O. III. PHLEGMASIÆ PARENCHYMATOSÆ.

310 G. XII. CEPHALITIS.

Eſt phlegmaſia, in qua mentis ſtupor, ſomnolentia, ſopor cataphoricus, carphologia adſunt, cum pyrexia acuta typhode; pulſus ſucceſſive molleſcit, cum frequentia ſine celeritate; aegri ſunt admodum debiles; lingua plerumque mollis, ſudor quaſi perpetuus; caput ſaepe manibus impetunt, fricant etiam deliri. Ter obſervavi jam hunc morbum, et poſt mortem in cujuſlibet aegri cadavere ſuppurationem cerebri inveni; reſpirabant hi aegroti cum ſonitu ſine ſtertore.

311 G. XIII. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyſpnoea gravis, ſenſus oppreſſionis gravativae ſub ſterno, calor et anxietas in pectore, tuſſis cruenta, facies rubra, lingua rubra tumidula; pulſus in-

incremento magnus, ſub inſpiratione remittens, vel penitus intermittens, ad finem morbi mollis.

G. XIV. HEPATITIS. 312

Eſt phlegmaſi acuta, cujus ſymptomata ſunt tenſio dolorifica hypochondrii dextri ſub coſtis ſpuriis, cum ſenſu ardoris ac gravitatis, dyſpnoeá, tuſſi ſiccá, faciei colore flaveſcente, ſiti, anorexia, ſaepius et ſingultu, vomitione et tumore hepatis; pulſus eſt ſubdurus, tenſus; urinae icteritiae, biliosae; ſerum ſanguinis miſſi et cruſta ſubflava; febris quaſi ſemper remittens.

G. XV. SPLENITIS. 313

Cognoſcitur haec phlegmaſia febre remittente, ſaepius tetartophya, tumore, duritie in regione lienis, dolore tactum fugiente pulſatili, calore, dyſpnoea, pulſu in inſpiratione intermittente in carpo ſiniſtro magis, et abſentia ſymptomatum nephriticorum; frigent hi aegri artubus; calor internus non eſt adeo magnus; ſanguis miſſus eſt cruſta inflammatoria tectus; cibi adeſt faſtidium, decubitus in la-

tus ſiniſtrum difficilis, ſitis et anxietas: Semel obſervavi hunc morbum ſicut illum hic deſcripſi.

314 G. XVI. NEPHRITIS.

Eſt phlegmaſia pyrexia acuta, dolore renum inflammatorio, urinae ardore, mictione frequenti ſtipata; dolor ſequitur ureteres, teſtis retrahitur, rotatur, crus ſtupet, plerumque adeſt vomitio, ſine augmento doloris aeger poteſt corpus ad anteriora flexum erigere.

315 G. XVII. METRITIS.

Hanc phlegmaſiam adeſſe noſcimus tumore, ardore, dolore, gravitate in regione uteri, et pyrexia acuta; digiti in vaginam immiſſi os uteri tactum non fert, idem valde calet; adeſt dolor ad inguina, femora, diaphragma, qui ad claviculas extenditur, cum dyſpnoea, nauſea, vomitione, ſingultu, obſtipatione, iſchuria, vel dyſuria, horrore perpetuo, frigore extremorum, delirio, jactatione, ſpaſmis, dolore oculorum; pulſus varius, animi deliquia, ſopor, tetanus, catalepſis obſervantur, cum febre plerumque remittente.

CLASSIS XII.
FEBRES.

Char. Classis. Pulſus frequens, celer, fortis; reſpiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis; vel virium vitalium augmentum, aut ſaltem in ſtatu ſanitatis perſeveratio, viribus artuum notabiliter minutis.

O. I. FEBRES CONTINUÆ.

Pyrexia ſemel creſcit, et ſemel decreſcit, in decurſu aegritudinis.

G. I. JUDICATORIA. 316

Ingruit tota febris ſubito cum frigore, calore, capitis dolore, &c. pulſu aliquo critico, aut evacuationibus criticis, vires artuum parum ſunt minutae, vires contra vitales multum auctae, criticae; abſolvitur 4 diebus.

G. II. HUMORARIA. 317

Cognoſcitur haec febris pulſu irritationis, incremento ſucceſſivo uſque IV. V. VII.

vel IX. diem, duratione morbi uſque VII. IX. XI. vel XIV. diem, notabili debilitate artuum; vehementibus ſymptomatibus, et humorum augmento, aut vitio, unde noſcitur.

318 G. III. FRIGERARIA.

Eſt febris continuae genus, quae decurrit ad XVII. XXI. vel XXX. diem, incrementum habet longius praecedente; ingruit cum pulſu irritationis; pulſu et reſpiratione auctis, viribus artuum multum minutis; notabili frigore ſaepe et rigore, unde *Frigeraria;* lingua eſt ſordida, excreta omnia foetida, a ſtatu naturali multum diſtantia; haec eſt febris proprie *putrida.*

319 G. IV. TYPHUS.

Eſt febris continuae genus, quae plerumque ultra tres ſeptimanas durat, cum calore jam magno, jam nullo, urina et pulſu ſanorum ſimilibus, artuum ſumma debilitate; pulſus quandoque rarior eſt quam pulſus ſanus, color cutis pallidus, ſqualidus, exanthemata varia huic morbo ſuperveniunt epigenomena.

G. V. HECTICA. 320

Eſt febris continua, quae chronicorum morborum more ſenſim extendi ſuevit per plures ſeptimanas, imo menſes, ſine notabili virium proſtratione, cum exigua pulſus frequentia; urina ſaepius eſt turbida, pelliculam innatantem pinguem gerit; pulſus eſt ſubdurus, poſt paſtum frequentior, calor ad attactum eſt mordens; ſudores nocturni; febris haec, nullam habens exacerbationem notabilem, differt ab omni amphimerina, phthiſi, et tabe, quia ſuppurationem pro cauſa non habet; aegri ſunt plerumque orthoſtadii.

O. II. FEBRES REMITTENTES.

Sunt febres continuae cum exacerbationibus quotidianis, tertianis, quartanis, &c.

G. VI. AMPHIMERINA. 321

Eſt febris continua, cum exacerbationibus quotidianis ſibi ſimilibus.

G. VII. TRITÆOPHYA. 322

Eſt febris continua, cum exacerbationibus tertianis.

323 G. VIII. TETARTOPHYA.

Eſt febris continua, cum exacerbationibus quartanis, ſeu quartanae typum ſervantibus.

O. III. FEBRES INTERMITTENTES.

Pyrexia in decurſu aegritudinis pluries penitus deſerit aegrum, et redit cum intervallis mediis lucidis, ſervata periodo.

324 G. IX. QUOTIDIANA.

Febris intermittens, cujus paroxyſmi ſimiles redeunt nycthemeris ſingulis.

325 G. X. TERTIANA.

Eſt febris intermittens, cujus paroxyſmi alternis diebus ſibi ſimiles repetunt, ſeu circuitum ſervant; urinae lateritiae ſunt optimum ſignum febrium intermittentium.

326 G. XI. QUARTANA.

Eſt febris intermittens, cujus paroxyſmi ſibi ſimiles quarta quavis die abeunt, et revertuntur; inter quoſlibet duos paroxyſmos intercedunt duae dies apyretae.

G. XII. ERRATICA. 327

Haec febris diſtinguitur ab aliis generibus per acceſſus ſimiles pluribus diebus ab invicem diſtantes quam duobus, nec proinde ad priora genera referri poteſt.

CLASSIS XIII.
VESANIÆ.

Char. Classis. Morbus mentis, ſeu error in imaginatione, appetitu, judicio, vel memoria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.

Imaginationes deceptivae ex errore organi, vel mentis natae.

328 G. I. VERTIGO.

Eſt hallucinatio, qua objecta, licet quieſcentia, e loco moveri, nutare, vel in gyrum verſari, nobis videntur, ipſeque aeger quandoque ſibi nutare videtur; dicta phaenomena etiam clauſis oculis plerique patiuntur.

329 G. II. SUFFUSIO.

Eſt genus morbi imaginarii, cujus praecipuum ſymptoma eſt hallucinatio viſus

circa objecta videntis corpora, quorum prototypus extra oculos non exiſtit; ſufſuſio repraeſentat corpora quae non ſunt, et vertigo motum corporum, quo actu non aguntur.

G. III. DIPLOPIA. 330

Eſt hallucinatio, qua affecti idem objectum geminatum, aut multiplicatum, videntur ſibi videre.

G. IV. SYRIGMUS. 331

Eſt error imaginationis ſonos, qui extra aurem non ſunt, ſibi repraeſentantis, a commotione vibratoria organorum acouſticorum per principia in aure latentia natos.

G. V. HYPOCHONDRIASIS. 332

Eſt delirium circa propriam valetudinem, natum ex philautia, ſalvo ratiocinio de reliquis, delirant et deſperant de ſua valetudine recuperanda ob ructus, borborygmos, palpitationes, tremorem praecordiorum, fugaces vertigines, flatulentiam, &c. Hinc hi perſuaſi fatum lethale ſibi imminere, omnia ſymptomata et minimas mu-

tationes in corpore ſuo ſcrupuloſe obſervant, narrant, et deſcribunt medicis, ſuiſque querulis, alios mox et alios defatigant, ingenio caeterum et appetitu pollentes.

333 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Eſt dormientium hallucinatio, ſomniantes, nempe, ob imaginationem vividiſſimam, ſopitis ſomno ſenſibus, motus muſculares exercent, ſurgunt e lecto, variis periculis ſeſe exponunt, tecta ſcandunt, iter ſuſcipiunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates, vel averſationes depravatae.

334 G. VII. PICA.

Eſt alimentorum inaſſuetorum, vel rerum indigeſtibilium, appetitus, cum aſſuetorum averſatione.

335 G. VIII. BULIMIA.

Eſt appetitus majoris alimentorum digeſtibilium et ſolitorum copiae, quam quae a viribus ventriculi digeri poteſt.

G. IX. POLYDIPSIA. 336

Eſt potulentorum appetitus immodicus.

G. X. ANTIPATHIA. 337

Eſt averſatio quorundam objectorum tanta, quod homo ex eorum viſu, odoratu, auditu, &c. gravia ſymptomata patiatur.

G. XI. NOSTALGIA. 338

Eſt deſiderium videndi parentes, cognatos, ſolumque natale adeundi adeo ardens, ut hac ſola anhelatione occupati penitus langueant; horumque animae commercium cum corpore ferme ſublatum ſit; unde languent omnes ſenſus, et appetitus alii; hectica febris hos miſeros conſumit, et ad lethum ducit, ſi adeundi patriam cognatos copia denegetur; olim in Croatia Criſii laboravi hoc malo cum apoſitia, et obſtipatione, intumueram ex anaſarca pervigil et debilis; redux ad patriam ſine omni pharmaco convalui; deſideramus varia ardentiſſime.

G. XII. PANOPHOBIA. 339

Eſt ſummus pavor inter dormiendum ſine cauſa evidenti ortus; clamant hi, gemunt,

tremunt, ſudant; hoc genus non multum differt ab ephialte.

340 G. XIII. SATYRIASIS.

Eſt morbus proprius viris, cujus praecipuum ſymptoma eſt effraenis impudenſque veneris cupiditas, cum libidinoſa penis tentigine; priapiſmus caret cupiditate libidinoſa.

341 G. XIV. NYMPHOMANIA.

Hujus generis character eſt effraene, audax, et impudens in foeminis veneris deſiderium.

342 G. XV. TARANTISMUS.

Hic morbus ſcribitur in Apulia eſſe endemius, cujus praecipuum ſymptoma eſt inexplicabilis ſaltandi, choreas agendi cupiditas; a tarantulae morſu excitari hunc morbum judicat Baglivius, quod Ill. Serao et experimenta Romana inficiantur.

343 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Eſt morbus, cujus praecipium ſymptoma eſt incredibilis potulentorum omnium aver-

ſatio, impoſſibilis deglutitio; vitant inſuper lucem et aëris motum.

G. XVII. RABIES. 344

Eſt morbus in lupis et canibus obſervatus, cujus praecipuum ſymptoma eſt effraenis cupiditas mordendi obvios omnes, licet innocuos, ſine hydrophobia; conſtat enim repetita apud Gallo-Provinciales experientia canes lupoſque rabidos bibiſſe, manducaſſe, et flumen tranaſſe; hic nihilominus morbus ſaepius eſt ſymptoma hydrophobiae: Vide diſſertationem Ill. de *Sauvages* de Rabie. Rabies porro datur *canina maniaca*, et *daemonomaniaca*: Vide *Hydrophobiam*.

O. III. D E L I R I A.

Delirium eſt ortus idearum non reſpondens objectis in ſenſus incidentibus, ſed internae cerebri diſpoſitioni a qua naſcuntur ideae delirantium.

G. XVIII. PARAPHROSYNE. 345

Eſt delirium fugax a veneno, vel alio morbo dependens, cujus comes et ſymptoma eſt.

346 G. XIX. AMENTIA.

Eſt inſania chronica, univerſalis, mitis, ſeu ineptitudo ad recte ratiocinandum et judicandum, cum ſenſu et perceptione objectorum, aſt ſine attentione.

347 G. XX. MELANCHOLIA.

Eſt inſania chronica partialis, moeſta, meditabunda; delirant melancholici ſine furore, et ſine febre, de uno potiſſimum objecto conſtanter, delirant circa ſemetipſos, aut ſuum ſtatum, de reliquis objectis adhuc ſat bene ratiocinantes; mihi videtur cauſſa hujus morbi latere in abdomine, ganglia ſemilunaria afficere, et plexus nervorum abdominales.

348 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Eſt delirium ſine febre reipſa tale, vel tantum ſimulatum, quo magi, ſagae, praeſtigiatores ſe tanquam a daemone obſeſſos oſtentant, varia phaenomena leges naturales excedentia praeſtare, exhibere volunt.

349 G. XXII. MANIA.

Eſt delirium apyretum circa quaevis objecta, cum furore, audacia, ac rubore; ma-

niaci habent plerique lucida intervalla; ſubin eſt mania periodica; unde Lunatici; ſanguis maniacorum viſcidus, ſeroque carens, fibrae muſculares rigidae.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXIII. AMNESIA. 349

Eſt memoriae imminutio aut plenaria abolitio.

G. XXIV. AGRYPNIA. 350

Pervigilium immodicum vel continuum, ex quo vires imminuuntur; anxietas, inquietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque moleſta ſymptomata, oriuntur.

PARS QUINTA.

TABULÆ NOSOLOGICÆ

AB EXIMIO MEDICO

DAVIDE MACBRIDE

COMPOSITÆ,

EX EJUS OPERE CUI TITULUS,

A Methodical Introduction to the Theory and Practice of Phyſic.

London 1772.

TABULÆ NOSOLOGICÆ.

ERUDITUS auctor morbus in quatuor claſſes, in univerſales, ſcilicet, locales, ſexuales, et infantiles, diſtribuere voluit; diſtributionem tamen non niſi per primam claſſem proſecutus eſt.

Morbos in hac claſſe comprehendendos in novem tabulas ſive ordines diſpoſuit, quos hic recenſere volumus.

ORDO I. FEBRES.

Genus I. FEBRIS CONTINUA.

Species 1. Continua ſimplex.

Verietates ſunt A Continua ſimplex plethorica.
B Continua ſimplex a frigore.
C Continua ſimplex a calore.
D Continua ſimplex a dolore.
E Continua ſimplex catarrhalis.

Sp. 2. Continua inflammatoria.

Var. A Continua inflammatoria cephalalgica.
B Continua inflammatoria ſoporoſa.
C Continua inflammatoria pleuritica.
D Continua inflammatoria rheumatica.
E Continua inflammatoria dyſenterica.

Sp. 3. Continua nervoſa.

Var. A Continua nervoſa communis ſeu febricula.
B Continua hyrocephalica.

Sp. 4 Continua putrida.

Var. A Continua putrida carceraria.
B Continua putrida maligna Hungarica.
C Continua putrida maligna Ægyptiorum.
D Continua putrida icteriodes Carolinenſis.
E Continua putrida icteriodes Canadenſis.

Sp. 5. Continua miſta.

Var. A Continua miſta depuratoria.
B Continua miſta ſudatoria.
C Continua miſta comatoſa.
D Continua miſta varioloſa.
E Continua miſta hyemalis.
F Continua miſta verminoſa.

G. II. FEBRES INTERMITTENS.

Sp. 1. Quotidiana.

Var. A Quotidiana ſimplex.
B Quotidiana duplicata.
C Quotidiana hyſterica.
D Quotidiana cephalalgica.

Sp. 2. Tertiana.

Var. A Tertiana legitima.

B Tertiana ſpuria.

C Tertiana pleuritica.

D Tertiana aſthmatica.

E Tertiana carotica.

F Tertiana cardialgica.

G Tertiana duplex.

H Tertiana duplicata.

I Tertiana urticata.

K Tertiana hemiplegica.

L Tertiana rheumatica.

Sp. 3. Quartana.

Var. A Quartana legitima.

B Quartana ſplenetica.

C Quartana hepatica.

D Quartana metaſtatica.

Sp. 4. Erratica.

Var. Quintana, ſextana, &c.

G. III. FEBRIS REMITTENS.

Sp. 1. Remittens inflammatoria.

Var. A Remittens inflammatoria catarrhalis.

B Remittens inflammatoria peripneumonica.

C Remittens inflammatoria ardens.

Sp. 2. Remittens putrida.

Var. A Remittens putrida bilioſa.

B Remittens putrida anginoſa maligna.

C Remittens putrida paludoſa.

G. V. FEBRIS EXANTHEMATICA.

Sp. 1. Variola.

Var. A Variola ſimplex.

a Variola ſimplex diſcreta.

b Variola ſimplex confluens.

c Variola ſimplex chryſtallina.

d Variola ſimplex verrucoſa.

B Variola complicata.

a Variola complicata inflammatoria.

b Variola complicata chryſtallina.

c Variola complicata nigra ſeu ſanguinea.

d Variola complicata dyſenterica.

Sp. 2. Morbilli.

Var. A Morbilli regulares.

B Morbilli anomali.

C Morbilli varioloſi.

Sp. 3. Scarlatina.

Var. A Scarlatina benigna.

B Scarlatina maligna.

Sp. 4. Eryſipelas.

Sp. 5. Miliaria.

Var. A Miliaria ſimplex.

B Miliaria catarrhalis.

C Miliaria inflammatoria.

D Miliaria ſeroſa.

E Miliaria putrida ſeu petechialis.

Sp. 6. Aphtha.

Sp. 7. Pemphigus.

Sp. 8. Peſtis.

G. V. HECTICA.

Sp. 1. Phthiſis.

Var. A Phthiſis ſicca.
B Phthiſis mucoſa.
C Phthiſis haemoptoica.
D Phthiſis ſcrofuloſa.
E Phthiſis ſcorbutica.
F Phthiſis aſthmatica.
G Phthiſis ſyphilitica.
H Phthiſis arthritica.
I Phthiſis hypochondriaca.
K Phthiſis chlorotica.

Sp. 2. Tabes.

Var. A Tabes hepatica.
B Tabes meſenterica.
C Tabes dorſalis.
D Tabes ſcrofuloſa.
E Tabes ſcorbutica.
F Tabes aſthmatica.
G Tabes ſyphilitica.
H Tabes arthritica.
I Tabes hypochondriaca.
K Tabes chlorotica.

ORDO II. INFLAMMATIONES.

G. I. INFLAMMATIO EXTERNA.

Sp. 1. Phlegmone.
Sp. 2. Eryſipelas.
Sp. 3. Furunculus.
Sp. 4. Anthrax.
Sp. 5. Ophthalmia.
Sp. 6. Cynanche.
Var. A Cynanche tonſillaris.
B Cynanche trachealis.
C Cynanche ſuffocatio ſtridula, Croup.
D Cynanche maxillaris.

G. II. INFLAMMATIO INTERNA.

Sp. 1. Phrenitis.
Sp. 2. Otitis.
Sp. 3. Carditis.
Sp. 4. Pleuritis.
Var. A Pleuritis ſimplex.
B Pleuritis complicata.
Sp. 5. Peripneumonia.
Var. A Peripneumonia ſimplex.
B Peripneumonia complicata.
Sp. 6. Paraphrenitis
Sp. 7. Hepatitis.

Sp. 8. Splenitis.

Sp. 9. Epiploitis.

Sp. 10. Gaſtritis.

Var. A Gaſtritis exanthematica.

B Gaſtritis a veneno.

C Gaſtritis traumatica.

Sp. 11. Enteritis.

Var. A Enteritis dyſenterica.

B Enteritis hernioſa.

C Enteritis a veneno.

Sp. 12. Meſenteritis.

Sp. 13. Nephritis.

Sp. 14. Cyſtitis.

ORDO III. FLUXUS.

G. I. ALVI FLUXUS.

Sp. 1. Cholera.

Var. A Cholera ſpontanea.

B Cholera verminoſa.

C Cholera arthritica.

Sp. 2. Dyſenteria.

Var. A Dyſenteria putrida.

B Dyſenteria inflammatoria.

Sp. 3. Diarrhoea.

Var. A diarrhoea ſtercoroſa.

B Diarrhoea bilioſa.

C Diarrhoea ſeroſa.

D Diarrhoea verminoſa.

Sp. 4. Lienteria.

Sp. 5. Caeliaca.

Sp. 6. Hepatirrhoea.

Sp. 7. Melaena.

G. II. HÆMORRHAGIA.

Sp. 1. Epiſtaxis.

Var. A Epiſtaxis critica.

B Epiſtaxis activa.

C Epiſtaxis paſſiva.

Sp. 2. Haemoptyſis.

Var. A Haemoptyſis accidentalis.

B Haemoptyſis habitualis.

C Haemoptyſis periodica.
D Haemoptyſis traumatica.

Sp. 3. Haematemeſis.

Sp. 4. Haematuria.

Sp. 5. Haemorrhois.

G. III. FLUXUS HUMORALIS.

Sp. 1. Ephidroſis.

Sp. 2. Diabetes.

Var. A Diabetes verus.
B Diabetes hyſtericus.
C Diabetes arthriticus.
D Diabetes febricoſus.

O. IV. DOLORES.

G. I. ARTHRITIS.

Sp. 1. Arthritis regularis.
Sp. 2. Arthritis irregularis.
Sp. 3. Arthritis complicata.
Var. A Arthritis rheumatica.
B Arthritis chlorotica.
C Arthritis melancholica.
D Arthritis ſcorbutica.
E Arthritis ſyphilitica.
F Arthritis aſthmatica.
G Arthritis cardialgica.
H Arthritis exanthematica.
I Arthritis rachitica.

G. II. RHEUMATISMUS.

Sp. 1. Rheumatiſmus acutus.
Sp. 2. Rheumatiſmus chronicus.
Var. A Rheumatiſmus dyſentericus.
B Rheumatiſmus arthriticus.
C Rheumatiſmus ſcorbuticus.
D Rheumatiſmus ſyphiliticus.
E Rheumatiſmus hyſtericus.
Sp. 3. Lumbago.
Sp. 4. Sciatica.

G. III. OSTOCOPUS.

Sp. 1. Oſtocopus ſpina ventoſa.
Sp. 2. Oſtocopus cancroſus.
Sp. 3. Oſtocopus ſyphiliticus.
Sp. 4. Oſtocopus ab oſteoſarcoſi.
Sp. 5. Oſtocopus ſcorbuticus.

G. IV. DOLOR CAPITIS.

Sp. 1. Cephalalgia.
Sp. 2. Cephalaea.
Sp. 3. Hemicrania.

G. V. ODONTALGIA.

Sp. 1. Odontalgia catarrhalis.
Sp. 2. Odontalgia carioſa.
Sp. 3. Odontalgia ſcorbutica.
Sp. 4. Odontalgia arthritica.
Sp. 5. Odontalgia hyſterica.

G. VI. OTALGIA.

Sp. 1. Otalgia inflammatoria.
Sp. 2. Otalgia purulenta.
Sp. 3. Otalgia verminoſa.
Sp. 4. Otalgia ab intruſis.
Sp. 5. Otalgia catarrhalis.

G. VII. PLEURODYNE.

Sp. 1. Pleurodyne plethorica.
Sp. 2. Pleurodyne flatulenta.
Sp. 3. Pleurodyne a ſpaſmate.
Sp. 4. Pleurodyne parapleuritica.
Sp. 5. Pleurodyne verminoſa.

G. VIII. DOLOR VENTRICULI.

Sp. 1. Pyroſis.
Var. A Pyroſis a ſaburra.
B Pyroſis bilioſa.
C Pyroſis ulceroſa.

Sp. 2. Cardialgia.
Var. A Cardialgia ſaburralis.
B Cardialgia a veneno.
C Cardialgia ſputatoria.
D Cardialgia bradypepta.
E Cardialgia arthritica.
F Cardialgia verminoſa.

Sp. 3. Gaſtrodynia.
Var. A Gaſtrodynia ab ingluvie.
B Gaſtrodynia flatulenta.
C Gaſtrodynia bilioſa.
D Gaſtrodynia a veneno.
E Gaſtrodynia a xyphoide.
F Gaſtrodynia ab extraneis.

G. IX. COLICA.

Sp. 1. Colica flatulenta.

Sp. 2. Colica inflammatoria.

Sp. 3. Colica bilioſa.

Sp. 4. Colica iliaca.

Sp. 5. Colica nervoſa.

G. X. LITHIASIS.

Sp. 1. Lithiaſis nephritica.

Sp. 2. Lithiaſis cyſtica.

G. XI. ISCHURIA.

Sp. 1. Iſchuria renalis.

Var. A Iſchuria renalis ab inflammatione.
B Iſchuria renalis ſpaſmodica.
C Iſchuria renalis mucoſa.
D Iſchuria renalis calculoſa ſeu arenoſa.

Sp. 2. Iſchuria veſicalis.

Var. A Iſchuria veſicalis calculoſa.
B Iſchuria veſicalis inflammatoria.
C Iſchuria veſicalis ſpaſmodica.
D Iſchuria veſicalis paralytica.
E Iſchuria veſicalis polyurica.
F Iſchuria veſicalis purulenta.

Sp. 3. Iſchuria urethralis.

Var. A Iſchuria urethralis carunculoſa.
B Iſchuria urethralis urethro lithica.
C Iſchuria urethralis hydrocelodes.

G. XII. PROCTALGIA.

Sp. 1. Proctalgia inflammatoria.
Sp. 2. Proctalgia fiſtuloſa ſeu purulenta.
Sp. 3. Proctalgia haemorrhoidalis.
Sp. 4. Proctalgia cancroſa.
Sp. 5. Proctalgia intertriginoſa.

O. V. SPASMI.

G. I. TETANUS.

Sp. 1. Tetanus epiſthotonos.

Sp. 2. Tetanus opiſthotonos.

G. II. CATOCHUS.

G. III. TRISMUS.

Sp. 1. Triſmus ſpontaneus vel primarius.

Sp. 2. Triſmus ſecundarius.

G. IV. HYDROPHOBIA.

Sp. 1. Hydrophobia ſpontanea.

Sp. 2. Hydrophobia ſecundaria.

G. V. CONVULSIO.

Sp. 1. Convulſio ab inanitione.

Sp. 2. Convulſio traumatica.

Sp. 3. Convulſio verminoſa.

Sp. 4. Convulſio plethorica.

G. VI. EPILEPSIA.

G. VII. ECLAMPSIA.

G. VIII. HIERANOSUS.

O. VI. ADYNAMIÆ.

G. I. COMA.

Sp. 1. Apoplexia.

Var. A Apoplexia ſanguinea.

B Apoplexia ſeroſa.

C Apoplexia traumatica.

D Apoplexia temulenta.

Sp. 2. Carus.

Sp. 3. Lethargus.

Sp. 4. Catalepſis.

G. II. PARALYSIS.

Sp. 1. Hemiplegia.

Sp. 2. Paraplegia.

G. III. DELIQUIUM.

Sp. 1. Leipothymia.

Sp. 2. Syncope.

Sp. 3. Aſphyxia.

O. VII. ANHELATIONES.

G. I. DYSPNŒA.

Sp. 1. Dyſpnoea pituitoſa.
Sp. 2. Dyſpnoea a tuberculis.
Sp. 3. Dyſpnoea calculoſa.
Sp. 4. Dyſpnoea phyſconialis.
Sp. 5. Dyſpnoea ſcorbutica.

G. II. ORTHOPNŒA.

Sp. 1. Orthnopnoea idiopathica.
Var. A Catarrhus ſuffocativus.
B Peripneumonia notha.
Sp. 2. Orthopnoea ſympathica.
Var. A Orthopnoea hyſterica.
B Orthopnoea ſtomachica.

G. III. ASTHMA.

Sp. 1. Aſthma humidum.
Sp. 2. Aſthma ſiccum.

G. IV. HYDROTHORAX.

G. V. EMPYEMA.

O. VIII. MENTALES.

Morborum qui ſub hoc titulo recenſeri poſſint nullam tabulam hic oppoſuit clariſſ. Auctor; et, ob hanc cauſam, ut videtur, quod dubitat an genera maniae et melancholiae, ſub hoc titulo vulgo recenſita, revera aliter differant quam idem natura morbus qui ſub diverſa facie diverſis temporibus compareat.

O. IX. CACHEXIÆ.

G. I. POLYSARCIA.

G. II. HYDROPS.

Sp. 1. Anaſarca.
Sp. 2. Hydrocephalus.
Sp. 3. Hydrops pectoris.
Sp. 4. Aſcites.

G. III. ICTERUS.

Sp. 1. Icterus ſpaſmodicus.
Sp. 2. Icterus a preſſura.
Sp. 3. Icterus calculoſus.

G. IV. EMPHYSEMA.

Sp. 1. Emphyſema primarium.
Sp. 2. Emphyſema ſecundarium a vulneribus thoracis.

G. V. TYMPANITES.

G. VI. PHYSCONIA.

G. VII. ATROPHIA.

G. VIII. OSTEOSARCOSIS.

G. IX. SARCOSTOSIS.

G. X. MORTIFICATIO.

Sp. 1. Sphacelus.

Sp. 2. Necroſis.

G. XI. SCORBUTUS.

G. XII. SCROFULA.

G. XIII. CANCER.

G. XIV. LUES VENEREA.

FINIS.

[illegible] 6/83